

## ANNEXE 2

## ESPECES NECESSITANT UN PLAN DE RESTAURATION EN 2009

## Espèces « Grenelle » (7)

## Flore :

- *Anchusa crispa* (France métropolitaine) : espèce, angiosperme, présente en Corse sur des sols sablonneux en arrières-plages et dunes littorales.
- *Astrocaryum minus* (Guyane) : espèce de la famille du Palmier, endémique des régions occidentales du bassin de l'Amazone et en Guyane française. Son écologie est de type forêt sempervirente de terre ferme, en basse altitude.
- *Bactris nancibaensis* (Guyane) : espèce de la famille du palmier, endémique de Guyane française, située dans la région de Cayenne. Son écologie est de type sous-bois de forêts marécageuses.

**+ une espèce de flore présente à La Réunion devant être choisie, par les autorités locales de l'Etat, parmi :**

- *Acanthophoenix rubra* : espèce de la famille du Palmier, endémique de l'île Maurice et de l'île de la Réunion. Son écologie est de type forêts hygrophiles de basse altitude de la côte au vent.
- *Bryopteris gaudichaudii* : espèce de la famille des Lejeunéacées, endémique du nord de Madagascar et de l'île de la Réunion. Il s'agit d'une hépatiche épiphyte des forêts tropicales humides.
- *Polyscias aemiliguineae* : espèce de la famille du Lierre, endémique de l'île de la Réunion, très localisée, au sud-ouest et sud-est de l'île avec une localité isolée au nord de l'île. Son écologie est de type forêt hygrophile de basse et moyenne altitudes (200-1000 m).
- *Poupartia borbonica* : espèce de la famille du Pistachier, endémique de l'île Maurice et de l'île de la Réunion. Essence présente en forêt semi-sèche de la côte sous le vent et des cirques intérieurs (100-720 m).

## Faune :

- *Helix ceratina* (France métropolitaine) : il s'agit d'un escargot endémique de Corse, présent au sud-est d'Ajaccio. C'est un des escargots les plus menacés de France.
- *Lantzia carinata* (Réunion) : espèce de la famille des Lymnées endémique de l'île de la Réunion. Cette espèce se rencontre entre 1000 et 1300 m d'altitude sur les roches se trouvant sous les cascades.
- *Leptodactylus falax* (Guadeloupe) : ou crapaud de la Dominique, de la famille des Leptodactylidés. Espèce forestière que l'on rencontre plutôt à proximité des cours d'eau permanent à fort dénivelé.

## Espèces issues de la priorisation nationale (7):

## Oiseaux :

- *Ganga cata* et *Alouette calandre* : ces deux espèces sont très localisées en France. L'essentiel de leurs effectifs se reproduit en plaine de Crau.

- **Pies grièches : sont concernées : la Pie-grièche à poitrine rose, la Pie-grièche méridionale, la Pie-grièche grise et la Pie-grièche à tête rousse.** L'aire de répartition de ces espèces est essentiellement méridionale sauf la Pie-grièche grise, qui est présente plus largement sur le territoire national et notamment dans le Limousin, l'Auvergne, la Bourgogne, la Franche-Comté, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. La Pie-grièche écorcheur n'est pas retenue en raison de son état de conservation jugé satisfaisant.

**Amphibien :**

- ***Bombina variegata* :** ou Sonneur à ventre jaune. Amphibien présent dans le centre, le nord-est et l'est de la France.

**Reptile :**

- ***Emyde lépreuse* :** tortue des eaux stagnantes ou à cours lent, présente en France dans le sud, plus particulièrement dans l'Hérault, les Pyrénées Orientales et les Pyrénées Atlantiques.

**Flore :**

- ***Saxifraga hirculus* :** plante herbacée présente dans le Jura, dans les zones de tourbières.
- ***Eryngium viviparum* :** plante herbacée des prairies humides temporaires atlantiques, présente en Bretagne dans le Morbihan.
- ***Aster des Pyrénées* ( décision en 2008)**

**Espèce ayant fait déjà l'objet d'un plan de restauration et nécessitant un second plan (1):**

- **le vautour moine**