

DOCOB Site FR3100481 - DUNES ET MARAIS ARRIERE-LITTORaux DE LA PLAINE MARITIME PICARDE – 20/02/14

TABLEAU DESCRIPTIF DES POLYGONES CARTOGRAPHIES

- Colonne 1 : Numéro du polygone (série continue du nord vers le sud, d'ouest en est)
- Colonne 2 : Observations : Pxx = Panne n° xx, TVX = zone ré-inventoriée en 2011 après travaux de gestion conservatoire.
- Colonne 3 : Numéro de l'entité : 1 = Dunes de Le Touquet-Stella, 2 = Dunes de Stella-Merlimont, 3 = Dunes de Merlimont-Berck
- Colonne 4 : Surface totale du polygone
- Colonne 5 : Numérotation des habitats présents dans le polygone (U = un seul habitat recensé dans le polygone)
- Colonne 6 : Nom latin de la végétation. En gras : habitat d'intérêt communautaire prioritaire, en italique : habitat non inscrit aux annexes de la directive.
- Colonne 7 : Type de milieu retenu pour la cartographie
- Colonne 8 : Recouvrement de l'habitat dans le polygone (100% si un seul habitat recensé)
- Colonne 9 : Surface couverte par le(s) habitat(s) dans le polygone
- Colonne 10 : Typicité de l'habitat : T = Typique, NT = Non Typique, NE = Non Evalué
- Colonne 11 : Etat de conservation de l'habitat (cf. Docob \$ A-2-2-3) : 1 = Favorable, 2 = non représentatif, 3 = Défavorable, NE = Non Evalué, NI = Non Inscrit
- Colonne 12 : Code du cahier d'habitats décliné ou dit "élémentaire". Lorsqu'une végétation ne relève pas de la directive habitats, la mention « NI » est indiquée.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
1		1	5 939 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	5 939 m²	NT	2	2120-1
2		1	4 638 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	4 638 m²	NT	3	2160-1
3		1	830 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	830 m²	NT	3	2120-1
4		1	295 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	295 m²	NE	NI	NI
5		1	13 589 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978 - faciès à Tremble	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	13 589 m²	NE	2	2180-5
6		1	15 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	100	15 m²	NE	NE	2160-1
7		1	1 003 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	752 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	25	251 m²	NT	2	2160-1
8		1	466 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	466 m²	NE	NI	NI
9		1	1 536 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 536 m²	T	2	2120-1
10		1	3 730 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	60	2 238 m²	T	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	746 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	20	746 m²	NE	NE	2120-1
11		1	1 717 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	60	1 030 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	35	601 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	5	86 m²	NE	NE	2130-1*
12		1	3 039 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	60	1 824 m²	T	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	608 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	20	608 m²	NE	NE	2120-1
13		1	44 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	35	15 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	65	28 m²	NE	NI	NI
14		1	1 196 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 196 m²	T	2	2120-1
15		1	157 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	157 m²	NE	NI	NI
16		1	8 809 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	4 845 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	45	3 964 m²	NT	3	2130-1*
17		1	185 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	185 m²	NE	NI	NI
18	Tvx	1	2 418 m²	Hab. 1	Groupe ment dunaire à Eupatorium cannabinum et Calamagrostis epigejos Duhamel 2009	Mégaphorbiaies	62	1 499 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	20	484 m²	NE	NE	2180-5
				Hab. 3	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	10	242 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 4	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	5	121 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 5	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	2	48 m²	NE	NE	2180-1
				Hab. 6	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	1	24 m²	NE	NE	2190-3
19		1	45 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	45 m²	NE	NI	NI
20		1	87 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	87 m²	NE	NE	2180-1
21		1	3 703 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	100	3 703 m²	NE	NE	2160-1
22		1	347 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	191 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	45	156 m²	NT	3	2130-1*

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
23		1	970 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	970 m²	NE	NE	2180-1
24		1	2 402 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	100	2 402 m²	NE	NE	2160-1
25		1	59 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	59 m²	T	2	2120-1
26		1	2 248 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	2 248 m²	NT	2	2120-1
27		1	3 377 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	40	1 351 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	60	2 026 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
28		1	19 756 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978 - faciès à Tremble	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	19 756 m²	NE	2	2180-5
29		1	1 705 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 705 m²	T	2	2120-1
30		1	483 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	266 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	45	217 m²	NT	3	2130-1*
31		1	1 437 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	100	1 437 m²	NE	NE	2130-1*
32		1	4 593 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978 - faciès à Tremble	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	4 593 m²	NE	2	2180-5
33		1	6 866 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	3 776 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	45	3 090 m²	NT	3	2130-1*
34		1	561 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	561 m²	T	3	2130-1*
35		1	1 120 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	100	1 120 m²	NE	NE	2160-1
36		1	192 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	192 m²	T	3	2130-1*
37		1	546 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	546 m²	NT	2	2160-1
38		1	9 481 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	9 481 m²	T	2	2120-1
39		1	7 478 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	100	7 478 m²	NT	2	2120-1
40		1	151 521 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	151 521 m²	NT	2	2160-1
41		1	1 239 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	682 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	45	558 m²	NT	3	2130-1*
42	Tvx	1	8 319 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	33	2 745 m²	NE	NE	2180-5
				Hab. 2	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	20	1 664 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 3	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	20	1 664 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 4	Groupe ment dunaire à Eupatorium cannabinum et Calamagrostis epigejos Duhamel 2009	Mégaphorbiaies	10	832 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 5	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	10	832 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 6	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	5	416 m²	NE	NE	2180-1
				Hab. 7	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	2	<i>166 m²</i>	NE	NE	2160-1
43		1	1 380 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	100	1 380 m²	NE	NE	2160-1
44		1	2 746 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	1 511 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	45	1 236 m²	NT	3	2130-1*
45		1	2 268 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	2 268 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
46		1	685 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	100	685 m²	NE	NE	2160-1
47		1	263 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	263 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
48		1	1 993 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 993 m²	T	2	2120-1
49		1	1 725 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	1 466 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	259 m²	NT	3	2130-1*
50		1	4 398 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	2 639 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	35	1 539 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 3	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	5	220 m²	NT	2	2120-1
51		1	51 028 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978 - faciès à Tremble	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	51 028 m²	NE	2	2180-5
52	Tvx	1	878 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	43	377 m²	NE	NE	2180-1
				Hab. 2	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	42	369 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 3	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	10	88 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 4	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	4	35 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 5	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	1	9 m²	NE	NE	2180-5
53		1	558 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	474 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	84 m²	NT	3	2130-1*
54		1	165 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	35	58 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	65	108 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
55		1	1 493 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	896 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	35	523 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 3	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	5	75 m²	NT	2	2120-1
56		1	1 672 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	1 003 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	35	585 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 3	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	5	84 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
57		1	7 816 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	7 816 m²	T	1	2160-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
58		1	309 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	77 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	75	232 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
59		1	194 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	194 m²	T	1	2130-1*
60		1	2 506 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	2 506 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
61		1	3 455 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	3 455 m²	T	2	2120-1
62		1	15 091 m²	U	Groupeement dunaire à Carex arenaria et Betula pendula Duhamel 2009	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	15 091 m²	NE	2	2180-1
63		1	90 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	90 m²	NT	3	2130-1*
64		1	1 254 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	1 254 m²	NT	2	2160-1
65		1	9 923 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	7 442 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	25	2 481 m²	NT	3	2130-4*
66		1	956 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	956 m²	NE	NE	2130-4*
67		1	199 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	50 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	75	149 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
68		1	101 054 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	55 580 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	45	45 475 m²	NT	3	2130-1*
69		1	422 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	422 m²	NT	3	2130-1*
70		1	6 970 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	2 788 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	40	2 788 m²	NE	NE	2120-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	1 394 m²	NT	3	2130-1*
71		1	42 436 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	42 436 m²	T	1	2160-1
72		1	20 987 m²	U	Groupeement dunaire à Carex arenaria et Betula pendula Duhamel 2009	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	20 987 m²	NE	2	2180-1
73		1	120 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	120 m²	NT	3	2130-1*
74		1	190 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	114 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	40	76 m²	NT	3	2120-1
75		1	378 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	94 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	75	283 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
76		1	709 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	532 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	177 m²	NT	3	2120-1
77		1	583 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	437 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	146 m²	NT	3	2120-1
78		1	124 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	124 m²	NT	2	2130-1*
79		1	2 682 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	2 682 m²	T	2	2120-1
80		1	12 966 m²	U	Groupeement dunaire à Carex arenaria et Betula pendula Duhamel 2009	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	12 966 m²	NE	2	2180-1
81		1	301 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	100	301 m²	NE	NE	2130-1*
82		1	1 615 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	100	1 615 m²	NE	NE	2160-1
83		1	1 116 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	837 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	279 m²	T	2	2130-1*
84		1	369 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	369 m²	T	1	2160-1
85		1	142 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	142 m²	NT	2	2130-1*
86		1	15 381 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	80	12 305 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	10	1 538 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	10	1 538 m²	NE	NE	2130-4*
87		1	221 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	221 m²	NT	2	2130-1*
88		1	3 376 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	3 376 m²	NT	2	2160-1
89		1	261 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	196 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	65 m²	NT	3	2120-1
90		1	69 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	69 m²	NT	2	2130-1*
91		1	1 343 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	1 343 m²	T	1	2160-1
92		1	157 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	157 m²	NT	2	2130-1*
93		1	1 714 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	1 286 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	25	429 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
94		1	662 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	70	464 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	20	132 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	66 m²	NT	3	2130-1*
95		1	153 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	100	153 m²	NE	NE	2130-1*
96		1	120 m²	U	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	100	120 m²	T	1	2120-1
97		1	498 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	498 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
98		1	2 247 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	1 685 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	25	562 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
99		1	525 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	70	367 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	20	105 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	52 m²	NT	3	2130-1*
100		1	908 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	908 m²	NE	NE	2190-3
101		1	16 549 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	55	9 102 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	40	6 620 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	5	827 m²	NT	3	2130-1*
102		1	95 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	85	81 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	15	14 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
103		1	298 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	223 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	74 m²	NE	2	2160-1
104		1	3 897 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	3 897 m²	NT	2	2160-1
105		1	10 634 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	10 634 m²	NT	2	2160-1
106		1	9 962 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978 - faciès à Tremble	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	9 962 m²	NE	2	2180-5
107		1	163 m²	U	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	100	163 m²	NT	2	2120-1
108		1	170 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	128 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	43 m²	NE	2	2160-1
109		1	301 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	301 m²	NT	3	2120-1
110		1	718 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	35	251 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	65	467 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
111		1	36 729 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	36 729 m²	T	1	2160-1
112		1	43 m²	U	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	100	43 m²	NT	2	2120-1
113		1	80 m²	U	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	100	80 m²	NT	2	2120-1
114		1	12 730 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	75	9 547 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	25	3 182 m²	NE	NE	2130-1*
115		1	5 987 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	60	3 592 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	40	2 395 m²	NT	2	2120-1
116		1	415 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	311 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	104 m²	NE	2	2160-1
117		1	768 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	75	576 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	25	192 m²	NE	NE	2130-1*
118		1	183 m²	Hab. 1	Beto maritimae - Atriplicetum laciniatae Tüxen (1950) 1967	Dune bordière	65	119 m²	NT	3	1210-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	64 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
119		1	821 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	821 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
120		1	282 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	282 m²	NT	2	2120-1
121		1	4 872 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	4 872 m²	NT	3	2120-1
122		1	338 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	338 m²	NE	NE	2190-3
123		1	425 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	425 m²	NE	NE	2180-1
124		1	6 617 m²	U	Cakilo maritimae - Corispermetum leptopteri Géhu 1989	Dune bordière	100	6 617 m²	NE	NE	1210-1
125		1	3 576 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	65	2 325 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	35	1 252 m²	NE	NE	2130-1*
126		1	3 832 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	75	2 874 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	25	958 m²	NE	NE	2130-1*
127		1	691 m²	U	<i>Végétation arborescente à base de pins divers (Pinus div. sp.), plantés ou colonisant la xérosère</i>	Boisements de substitution	100	691 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
128		1	252 m²	Hab. 1	Beto maritimae - Atriplicetum laciniatae Tüxen (1950) 1967	Dune bordière	65	164 m²	NT	3	1210-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	88 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
129		1	450 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	75	337 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	25	112 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
130		1	3 182 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	100	3 182 m²	NE	2	2120-1
131		1	7 487 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	7 487 m²	NT	2	2160-1
132		1	430 m²	Hab. 1	Beto maritimae - Atriplicetum laciniatae Tüxen (1950) 1967	Dune bordière	65	280 m²	NT	3	1210-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	151 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
133		1	3 528 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	65	2 293 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	1 235 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
134		1	765 m²	U	<i>Végétation arbustive à arborescente, à peupliers divers (Populus div. sp.), plantée ou colonisant la xérosère</i>	Boisements de substitution	100	765 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
135		1	47 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	47 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
136		1	7 176 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	7 176 m²	NT	3	2120-1
137		1	143 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	65	93 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	50 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
138		1	51 170 m ²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	45	23 027 m ²	NE	2	2180-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978 - faciès à Tremble	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	55	28 144 m ²	NE	2	2180-5
139		1	60 952 m ²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	75	45 714 m ²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	15 238 m ²	NT	3	2130-1*
140		1	2 276 m ²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	2 276 m ²	NT	2	2120-1
141		1	520 m ²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	520 m ²	NE	NE	2130-4*
142		1	869 m ²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	85	739 m ²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	130 m ²	NT	3	2130-1*
143	Tvx	1	2 564 m ²	Hab. 1	<i>Communauté dunaire à Teucrium scordium et Agrostis stolonifera</i>	Prairies hygroclines à hygrophiles	25	641 m ²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	25	641 m ²	NE	NE	2180-5
				Hab. 3	Groupe ment dunaire à Eupatorium cannabinum et Calamagrostis epigejos Duhamel 2009	Mégaphorbiaies	10	256 m ²	NE	NE	2190-5
				Hab. 4	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	10	256 m ²	NE	NE	2190-3
				Hab. 5	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	10	256 m ²	NE	NE	2180-1
				Hab. 6	Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis Schaminée & V. Westh. in Schaminée et al. 1992	Végétations amphibies et de bas-marais	10	256 m ²	NE	NE	2190-2
				Hab. 7	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	10	256 m ²	NE	NE	2160-1
144		1	62 196 m ²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	34 208 m ²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	45	27 988 m ²	NE	NE	2160-1
145		1	1 477 m ²	U	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 477 m ²	NT	2	2190-3
146		1	381 m ²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	60	228 m ²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	76 m ²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	Végétation arbustive à arborescente à peupliers et/ou Saule blanc (Salix alba)	Boisements de substitution	20	76 m ²	NE	2	2180-5
147		1	1 223 m ²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	65	795 m ²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	35	428 m ²	NT	3	2130-1*
148		1	2 005 m ²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	75	1 503 m ²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	25	501 m ²	NE	NE	2130-1*
149		1	1 018 m ²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	65	662 m ²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	35	356 m ²	NE	NE	2130-1*
150		1	1 090 m ²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	65	708 m ²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	381 m ²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
151		1	1 104 m ²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 104 m ²	NE	NE	2180-1
152		1	4 407 m ²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	3 305 m ²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	1 102 m ²	NE	3	2130-1*
153		1	551 m ²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	65	358 m ²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	193 m ²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
154		1	214 m ²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	214 m ²	NT	3	2130-1*
155		1	219 m ²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	219 m ²	NT	2	2160-1
156		1	2 396 m ²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	1 318 m ²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	45	1 078 m ²	NE	NE	2130-4*
157		1	23 647 m ²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	17 735 m ²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	5 912 m ²	NT	3	2130-1*
158		1	9 402 m ²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	7 991 m ²	T	2	2120-1
				Hab. 2	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	15	1 410 m ²	NT	2	2160-1
159		1	386 m ²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	386 m ²	NE	NE	2180-1
160		1	3 844 m ²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	60	2 306 m ²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	35	1 345 m ²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	5	192 m ²	NE	NE	2120-1
161		1	3 604 m ²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	2 703 m ²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	901 m ²	NE	3	2130-1*
162		1	1 048 m ²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	1 048 m ²	NE	NE	2130-4*
163		1	1 480 m ²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	65	962 m ²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	518 m ²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
164		1	540 m ²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	65	351 m ²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	189 m ²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
165		1	2 596 m ²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	1 428 m ²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	15	389 m ²	NT	2	2120-1
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	15	389 m ²	NE	NE	2160-1
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	15	389 m ²	NE	NE	2130-1*
166		1	1 620 m ²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	1 215 m ²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	405 m ²	NT	3	2130-1*

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
167	Tvx	1	2 014 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	70	1 410 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	20	403 m²	NT	2	2180-1
				Hab. 3	Groupeement dunaire à Eupatorium cannabinum et Calamagrostis epigejos Duhamel 2009	Mégaphorbiaies	10	201 m²	NT	NE	2190-5
168	Tvx	1	745 m²	Hab. 1	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	60	447 m²	NT	1	2190-3
				Hab. 2	Cladietum marisci Allorge 1922	Roselières	40	298 m²	NT	3	2190-5
169		1	225 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	25	56 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	50	112 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	25	56 m²	NE	NE	2130-1*
170		1	3 760 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	3 760 m²	NE	NE	2180-1
171		1	3 431 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	70	2 402 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	20	686 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	10	343 m²	NE	NE	2130-1*
172		1	304 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	65	198 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	35	107 m²	NT	2	2120-1
173		1	7 326 m²	U	Cakilo maritimae - Corispermetum leptopteri Géhu 1989	Dune bordière	100	7 326 m²	NE	NE	1210-1
174		1	5 962 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	50	2 981 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Festuco filiformis - Galietum maritimi Braun-Blanq. & de Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	1 490 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	25	1 490 m²	NE	NE	2160-1
175		1	1 370 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 370 m²	T	3	2120-1
176		1	1 020 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	1 020 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
177		1	2 111 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	100	2 111 m²	NE	NE	2160-1
178		1	784 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	588 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	196 m²	NE	2	2160-1
179		1	674 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	100	674 m²	NE	NE	2160-1
180		1	50 098 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	37 573 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	12 524 m²	NT	3	2130-1*
181	Tvx	1	5 313 m²	Hab. 1	<i>Végétation arborescente à base de pins divers (Pinus div. sp.), plantés ou colonisant la xérosère</i>	Boisements de substitution	80	4 250 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	15	797 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	4	213 m²	NT	3	2130-4*
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	1	53 m²	NT	3	2130-1*
182		1	5 981 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	5 981 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
183		1	492 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	492 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
184		1	1 179 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 179 m²	T	3	2120-1
185		1	3 370 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	3 370 m²	NT	2	2160-1
186		1	1 095 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 095 m²	NT	3	2120-1
187		1	1 422 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	40	569 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	60	853 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
188		1	2 285 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	2 285 m²	NT	3	2120-1
189		1	20 989 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978 - faciès à Tremble	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	60	12 593 m²	NE	NE	2180-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	40	8 396 m²	NE	NE	2160-1
190		1	715 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	55	393 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	45	322 m²	NE	NE	2160-1
191		1	663 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	564 m²	T	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	15	99 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
192		1	249 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	65	162 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	87 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
193		1	112 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	65	73 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	39 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
194		1	3 590 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	3 590 m²	NT	2	2160-1
195		1	153 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	153 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
196		1	489 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	294 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	196 m²	NE	2	2160-1
197		1	21 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	21 m²	NT	2	2120-1
198		1	106 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	106 m²	NT	2	2120-1
199		1	68 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	68 m²	NT	2	2120-1
200		1	30 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	30 m²	NT	2	2120-1
201		1	1 383 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 383 m²	NT	2	2120-1
202		1	582 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	582 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
203		1	707 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	707 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
204		1	1 304 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	1 304 m²	NT	2	2160-1
205		1	1 618 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	1 375 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	243 m²	NT	3	2130-1*
206		1	780 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	780 m²	NT	2	2130-1*
207		1	8 663 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	8 663 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
208		1	2 055 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	85	1 747 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	15	308 m²	NE	NE	2130-1*
209		1	479 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	60	288 m²	NE	NE	2180-1
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	20	96 m²	NE	1	2160-1
				Hab. 3	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	20	96 m²	NE	1	2190-3
210	Tvx	1	2 233 m²	U	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	2 233 m²	T	1	2190-3
211	Tvx	1	6 090 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	85	5 176 m²	NE	NE	2180-5
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	14	853 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	1	61 m²	NE	NE	2180-1
212	Tvx	1	642 m²	U	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	642 m²	T	1	2190-3
213	Tvx	1	328 m²	Hab. 1	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	49	161 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	49	161 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 3	Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis Schaminée & V. Westh. in Schaminée et al. 1992	Végétations amphibies et de bas-marais	1	3 m²	NE	NE	2190-2
				Hab. 4	Groupeement à Potamogeton gramineus et characées Duhamel 1995 nom. ined.	Végétations aquatiques - Plans d'eau	1	3 m²	NE	NE	2190-1
214	Tvx	1	463 m²	Hab. 1	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	85	393 m²	T	1	2190-3
				Hab. 2	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	15	69 m²	T	1	2190-2
215	Tvx	1	465 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	465 m²	NT	2	2160-1
216	Tvx	1	2 227 m²	Hab. 1	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	40	891 m²	T	NE	2190-3
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	29	646 m²	T	NE	2160-1
				Hab. 3	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	29	646 m²	T	NE	2190-3
				Hab. 4	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	1	22 m²	T	NE	2190-2
				Hab. 5	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	1	22 m²	NT	NE	2130-1*
217		1	4 211 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	2 316 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	1 895 m²	NT	2	2160-1
218		1	426 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	426 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
219		1	271 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	271 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
220		1	95 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	95 m²	NT	2	2120-1
221		1	206 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	206 m²	T	1	2130-1*
222		1	275 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	275 m²	NT	3	2130-1*
223		1	38 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	32 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	6 m²	NT	3	2130-1*
224		1	122 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	103 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	18 m²	NT	2	2130-1*
225		1	4 424 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	3 760 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	15	664 m²	NT	3	2160-1
226		1	2 358 m²	U	Cakilo maritimae - Corispermetum leptopteri Géhu 1989	Dune bordière	100	2 358 m²	NE	NE	1210-1
227		1	542 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	542 m²	NE	2	2120-1
228		1	1 831 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	1 831 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
229		1	35 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	35 m²	NE	2	2120-1
230		1	1 081 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	75	810 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	270 m²	NE	3	2130-1*
231		1	2 372 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	50	1 186 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	45	1 067 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	5	119 m²	NE	NE	2130-1*
232		1	40 667 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	100	40 667 m²	NE	2	2120-1
233		1	1 217 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 217 m²	NT	3	2120-1
234	Tvx	1	556 m²	Hab. 1	<i>Plan d'eau non végétalisé</i>	Végétations aquatiques - Plans d'eau	51	284 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Groupeement à Potamogeton gramineus et characées Duhamel 1995 nom. ined.	Végétations aquatiques - Plans d'eau	35	195 m²	T	1	2190-1
				Hab. 3	Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	10	56 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 4	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	4	22 m²	NT	2	2190-2
235	Tvx	1	1 740 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 740 m²	NT	2	2180-1
236		1	21 038 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	15 779 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	25	5 260 m²	NE	NE	2120-1
237		1	423 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	423 m²	T	2	2130-1*

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
238		1	6 156 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	5 233 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	923 m²	NT	3	2130-1*
239		1	46 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	46 m²	NT	3	2120-1
240		1	13 743 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	85	11 682 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	15	2 061 m²	NE	NE	2130-1*
241		1	642 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	642 m²	NT	3	2120-1
242		1	6 694 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	6 694 m²	NT	3	2120-1
243		1	412 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	412 m²	NT	3	2130-1*
244		1	10 962 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	10 962 m²	NT	2	2160-1
245		1	2 241 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	40	896 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	40	896 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	20	448 m²	NE	NE	2120-1
246		1	3 348 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	2 511 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	25	837 m²	NE	NE	2120-1
247		1	5 473 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	5 473 m²	NE	3	2130-1*
248		1	1 057 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 057 m²	NE	3	2120-1
249		1	27 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	27 m²	NE	3	2120-1
250		1	122 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	122 m²	NE	3	2120-1
251		1	64 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	64 m²	NE	3	2120-1
252		1	272 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	272 m²	NT	3	2130-1*
253		1	4 890 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	3 667 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	25	1 222 m²	T	2	2160-1
254		1	67 810 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978 - faciès à Tremble	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	60	40 686 m²	NE	NE	2180-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	40	27 124 m²	NE	NE	2160-1
255		1	3 484 m²	U	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	3 484 m²	NE	2	2190-3
256		1	2 930 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	55	1 612 m²	NE	3	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	1 319 m²	NE	2	2160-1
257		1	4 546 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	40	1 818 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	40	1 818 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	909 m²	NE	3	2130-1*
258		1	490 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	490 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
259		1	7 555 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	7 555 m²	NT	3	2120-1
260		1	31 808 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	31 808 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
261		1	330 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	330 m²	NT	3	2120-1
262		1	7 245 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	7 245 m²	NT	3	2120-1
263		1	35 466 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	35 466 m²	NT	2	2160-1
264		1	1 193 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	1 193 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
265	Tvx	1	448 m²	Hab. 1	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	78	350 m²	T	1	2190-3
				Hab. 2	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	20	90 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 3	Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	2	9 m²	NT	2	2190-3
266	Tvx	1	560 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	560 m²	T	1	2160-1
267		1	863 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	863 m²	NT	2	2120-1
268		1	4 355 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	25	1 089 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	75	3 266 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
269		1	304 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	304 m²	NT	3	2160-1
270		1	4 724 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	4 724 m²	T	2	2130-1*
271		1	281 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	281 m²	NE	3	2120-1
272		1	65 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	65 m²	NE	3	2120-1
273		1	211 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	211 m²	NE	3	2120-1
274		1	2 093 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	2 093 m²	NT	3	2120-1
275		1	4 195 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	4 195 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
276		1	2 464 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	1 478 m²	NE	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	985 m²	NE	2	2160-1
277		1	4 256 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	50	2 128 m²	NE	NE	2180-1
				Hab. 2	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	25	1 064 m²	NE	1	2190-3
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	25	1 064 m²	NE	NE	2190-3
278	Tvx	1	337 m²	Hab. 1	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	50	169 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	50	169 m²	NE	NE	2160-1
279	Tvx	1	950 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	50	475 m²	NE	NE	2190-3

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
				Hab. 2	Communauté à Carex arenaria et Calamagrostis epigejos	Ourlets et Prairies	45	427 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 3	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	5	47 m²	NE	NE	2190-2
280	Tvx	1	454 m²	Hab. 1	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	50	227 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	50	227 m²	NE	NE	2160-1
281	Tvx	1	857 m²	Hab. 1	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	90	771 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	5	43 m²	NT	NE	2190-2
				Hab. 3	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Eleocharitetalia palustris de Foucault 2008</i>	Prairies hygroclines à hygrophiles	5	43 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
282	Tvx	1	530 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	50	265 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	Communauté à Carex arenaria et Calamagrostis epigejos	Ourlets et Prairies	45	239 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 3	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	5	27 m²	NE	NE	2190-2
283	Tvx	1	1 045 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	1 045 m²	T	NE	2160-1
284	Tvx	1	454 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	43	195 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	25	113 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	15	68 m²	NE	NE	2120-1
				Hab. 4	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	15	68 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 5	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	1	5 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 6	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	1	5 m²	NE	NE	2190-2
285		1	3 488 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	3 488 m²	NT	3	2120-1
286		1	2 289 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	2 289 m²	NT	3	2120-1
287		1	2 241 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	60	1 344 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	30	672 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	224 m²	NE	3	2130-1*
288		1	978 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	70	685 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	196 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	Festuco filiformis - Galietum maritimi Braun-Blanq. & de Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	98 m²	NT	3	2130-1*
289		1	130 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	130 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
290		1	183 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	183 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
291		1	610 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	610 m²	NT	3	2130-1*
292		1	7 804 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	65	5 073 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	2 732 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
293		1	4 978 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	4 978 m²	T	2	2120-1
294		1	5 600 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	4 200 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	25	1 400 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
295		1	132 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	132 m²	NT	3	2130-1*
296	Tvx	1	3 661 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers. calamagrostietosum epigeji	Fourrés dunaires	34	1 245 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	33	1 208 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 3	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	33	1 208 m²	NE	NE	2180-5
297		1	751 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	751 m²	NE	NE	2180-1
298	Tvx	1	342 m²	Hab. 1	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	45	154 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	45	154 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 3	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	5	17 m²	NE	NE	2190-2
				Hab. 4	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	5	17 m²	NE	NE	2190-3
299	Tvx	1	245 m²	Hab. 1	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	70	172 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	Groupe ment dunaire à Eupatorium cannabinum et Calamagrostis epigejos Duhamel 2009	Mégaphorbiaies	25	61 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 3	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	5	12 m²	NT	NE	2190-2
300		1	407 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	407 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
301	Tvx	1	1 174 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	1 174 m²	T	NE	2160-1
302		1	5 476 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	60	3 286 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	30	1 643 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	548 m²	NE	3	2130-1*
303		1	52 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	50	26 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	<i>Groupe ment à Bromus tectorum & Silene conica (Duhamel 1994) Duhamel 2009</i>	Pelouses dunaires	25	13 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 3	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	25	13 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
304		1	15 560 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	15 560 m²	NT	2	2160-1
305		1	8 661 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	50	4 330 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	2 165 m²	NE	2	2130-1*
				Hab. 3	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	2 165 m²	NE	2	2160-1
306		1	220 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	220 m²	T	2	2120-1
307		1	2 358 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	60	1 415 m²	NT	3	2120-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	40	943 m²	NE	NE	2160-1
308		1	2 709 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	2 709 m²	T	2	2120-1
309		1	143 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	50	71 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	45	64 m²	NE	NE	2120-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	5	7 m²	NT	3	2130-1*
310		1	16 365 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	50	8 183 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	45	7 364 m²	NE	NE	2120-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	5	818 m²	NT	3	2130-1*
311		1	721 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	60	433 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	30	216 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	72 m²	NE	3	2130-1*
312		1	935 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	100	935 m²	NE	2	2120-1
313		1	5 945 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	5 945 m²	NE	2	2160-1
314		1	153 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	153 m²	T	2	2130-1*
315		1	376 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	226 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	151 m²	NE	2	2160-1
316		1	547 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	547 m²	T	2	2130-1*
317		1	1 726 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	55	949 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	45	777 m²	NT	2	2130-1*
318		1	293 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	293 m²	NT	3	2130-1*
319		1	1 548 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	65	1 006 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	542 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
320		1	321 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	321 m²	T	2	2130-1*
321		1	345 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	345 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
322		1	162 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	97 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	65 m²	NE	2	2160-1
323		1	3 765 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	75	2 823 m²	NE	3	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	941 m²	NE	3	2130-1*
324		1	70 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	70 m²	T	2	2130-1*
325		1	128 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	55	70 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	cf. Viola dunensis - Corynephorum canescens (Böcher 1941) V. Westh.. ap. V. Westh.. et al 1946 nom. nud.	Pelouses dunaires	45	58 m²	NE	2	2130-1*
326		1	10 029 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	10 029 m²	T	2	2130-1*
327		1	579 m²	U	<i>Zone anthropisée</i>	Milieux anthropisés	100	579 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
328		2	143 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	143 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
329		2	26 327 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	40	10 531 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	30	7 898 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	30	7 898 m²	NT	3	2130-1*
330		2	396 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	396 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
331		2	4 231 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	4 231 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
332		2	758 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	60	455 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	40	303 m²	NT	3	2120-1
333		2	7 634 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	55	4 199 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	45	3 435 m²	NE	NE	2180-1
334		2	2 149 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	40	860 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	30	645 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	30	645 m²	NT	3	2130-1*
335		2	11 653 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	50	5 827 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	2 913 m²	NE	2	2130-1*
				Hab. 3	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	2 913 m²	NE	2	2160-1
336		2	43 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	100	43 m²	NE	NE	2130-1*
337		2	533 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	533 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
338		2	101 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	101 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
339		2	364 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	364 m²	NT	2	2120-1
340		2	511 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	60	306 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	40	204 m²	NT	3	2120-1
341		2	599 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	40	240 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	50	299 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	10	60 m²	NE	NE	2160-1
342		2	2 855 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	75	2 141 m²	NE	NE	2180-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	25	714 m²	NE	NE	2160-1
343		2	1 016 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	1 016 m²	NE	2	2160-1
344		2	616 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	616 m²	NE	NI	NI
345		2	13 715 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	7 543 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	45	6 172 m²	NT	3	2130-1*
346		2	1 424 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	783 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	641 m²	NE	2	2160-1
347		2	202 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	202 m²	NE	NI	NI
348		2	78 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	78 m²	NE	NI	NI
349		2	686 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	686 m²	NE	NI	NI
350		2	397 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	397 m²	NE	NI	NI
351		2	1 670 m²	U	Zone anthropisée	Milieux anthropisés	100	1 670 m²	NE	NI	NI
352		2	1 527 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	55	840 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	Non prospecté	Milieux anthropisés	45	687 m²	NE	NI	NI
353		2	935 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	935 m²	NE	2	2160-1
354		2	329 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	329 m²	NT	2	2130-1*
355		2	472 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	472 m²	NT	2	2120-1
356		2	15 869 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	15 869 m²	NE	1	2160-1
357		2	375 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	65	244 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	35	131 m²	NE	NI	NI
358		2	9 598 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	55	5 279 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	45	4 319 m²	NT	2	2190-3
359		2	708 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	708 m²	NE	NI	NI
360		2	1 551 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	233 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 2	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	85	1 319 m²	NE	NI	NI
361		2	23 850 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	50	11 925 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	5 963 m²	NE	2	2130-1*
				Hab. 3	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	5 963 m²	NE	2	2160-1
362		2	3 033 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	3 033 m²	NT	2	2130-1*
363		2	727 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	65	472 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	35	254 m²	NE	NI	NI
364		2	558 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	558 m²	NT	3	2120-1
365		2	310 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	310 m²	NT	3	2120-1
366		2	223 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	65	145 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	35	78 m²	NE	NI	NI
367		2	132 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	132 m²	NE	NI	NI
368		2	1 108 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	831 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	222 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	5	55 m²	NT	3	2120-1
369		2	243 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	243 m²	NT	3	2120-1
370		2	1 119 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 119 m²	NT	3	2120-1
371		2	608 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	91 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	85	516 m²	NE	NI	NI
372		2	4 580 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	75	3 435 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	25	1 145 m²	NE	NE	2130-1*
373		2	968 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	968 m²	NE	2	2160-1
374		2	538 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	403 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	134 m²	NE	2	2160-1
375		2	48 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	48 m²	NE	NI	NI
376		2	14 410 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	55	7 925 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	45	6 484 m²	NE	NE	2180-1
377		2	8 255 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	100	8 255 m²	NE	NE	2130-1*
378		2	300 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	65	195 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	35	105 m²	NE	NI	NI
379		2	1 116 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	837 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	223 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	5	56 m²	NT	3	2120-1
380		2	1 157 m²	Hab. 1	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	55	636 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	45	520 m²	T	1	2160-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
381		2	157 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	65	102 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	55 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
382		2	9 412 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	7 059 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	1 882 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	5	471 m²	NT	3	2120-1
383		2	783 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	70	548 m²	T	2	2120-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	20	157 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 3	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	10	78 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
384		2	1 319 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	1 319 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
385		2	6 862 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	5 146 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	1 715 m²	NE	NE	2160-1
386		2	4 052 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	3 039 m²	NT	1	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	1 013 m²	NT	2	2130-1*
387		2	189 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	189 m²	T	1	2160-1
388		2	358 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	65	233 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	125 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
389		2	1 372 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 372 m²	NT	3	2120-1
390		2	1 087 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	815 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	272 m²	NE	2	2160-1
391		2	6 534 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	6 534 m²	NT	3	2160-1
392		2	301 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	50	151 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	50	151 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
393		2	1 505 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	1 505 m²	T	1	2160-1
394		2	20 980 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	20 980 m²	NT	3	2160-1
395		2	8 679 m²	U	Groupement dunaire à Carex arenaria et Betula pendula Duhamel 2009	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	8 679 m²	NT	2	2180-1
396		2	1 978 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	1 978 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
397		2	3 857 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	3 278 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	15	578 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
398		2	3 747 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	3 747 m²	T	2	2160-1
399		2	17 136 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	70	11 995 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	3 427 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 3	<i>Végétation arbustive à arborescente, à peupliers divers (Populus div. sp.), plantée ou colonisant la xérosère</i>	Boisements de substitution	10	1 714 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
400		2	8 955 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	7 612 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	1 343 m²	NT	3	2130-1*
401		2	13 324 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	100	13 324 m²	NE	2	2120-1
402		2	10 888 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	9 255 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	15	1 633 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
403		2	3 668 m²	U	<i>Non prospecté</i>	Milieux anthropisés	100	3 668 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
404		2	12 998 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	50	6 499 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	50	6 499 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
405		2	5 439 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	5 439 m²	NT	3	2120-1
406		2	717 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	717 m²	NT	2	2160-1
407		2	9 386 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	55	5 162 m²	NE	NE	2180-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978 - faciès à Tremble	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	45	4 224 m²	NE	2	2180-5
408		2	1 399 m²	U	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 399 m²	NT	2	2190-3
409		2	299 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	299 m²	NE	NE	2190-3
410		2	564 m²	U	Végétation arbustive à arborescente à peupliers et/ou Saule blanc (Salix alba)	Boisements de substitution	100	564 m²	NE	2	2180-5
411		2	265 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	265 m²	NT	2	2160-1
412		2	546 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	546 m²	NT	2	2160-1
413		2	204 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	204 m²	NT	3	2130-1*
414		2	6 064 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	60	3 638 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	40	2 426 m²	NE	2	2120-1
415		2	630 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	630 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
416		2	1 218 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	1 218 m²	NE	2	2160-1
417		2	2 516 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	2 516 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
418		2	6 052 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	4 539 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	1 513 m²	NE	2	2160-1
419		2	2 322 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	1 277 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	1 045 m²	NE	2	2160-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
420		2	2 071 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	2 071 m²	NE	2	2160-1
421		2	214 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	161 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	54 m²	NE	2	2130-1*
422		2	1 873 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	55	1 030 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	45	843 m²	NT	2	2130-1*
423		2	519 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	519 m²	NT	2	2130-1*
424		2	728 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	546 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	182 m²	NE	2	2130-1*
425		2	383 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	287 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	96 m²	NE	2	2160-1
426		2	27 499 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	60	16 500 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	40	11 000 m²	NT	2	2130-1*
427		2	19 313 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	75	14 485 m²	T	1	2180-5
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	4 828 m²	T	1	2160-1
428		2	559 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	559 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
429		2	2 869 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	2 869 m²	NT	2	2160-1
430		2	157 m²	U	cf. Violo dunensis - Corynephorum canescentis (Böcher 1941) V. Westh.. ap. V. Westh.. et al 1946 nom. nud.	Pelouses dunaires	100	157 m²	NT	2	2130-1*
431		2	377 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	94 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	75	282 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
432		2	132 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	79 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	53 m²	NE	2	2160-1
433		2	623 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	623 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
434		2	1 012 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	607 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	405 m²	NE	2	2160-1
435		2	13 152 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Estran	100	13 152 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
436		2	85 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	73 m²	NE	1	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	13 m²	NT	3	2130-1*
437		2	16 607 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	16 607 m²	T	2	2120-1
438		2	949 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	949 m²	NT	3	2160-1
439		2	366 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	60	219 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	40	146 m²	NE	NE	2160-1
440		2	3 368 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	3 368 m²	T	2	2130-1*
441		2	4 615 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	4 615 m²	NE	1	2160-1
442		2	373 m²	Hab. 1	Beto maritimae - Atriplicetum laciniatae Tüxen (1950) 1967	Dune bordière	65	242 m²	NT	3	1210-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	130 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
443		2	225 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	225 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
444		2	975 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	975 m²	NT	3	2130-1*
445		2	2 483 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	55	1 366 m²	NE	3	2130-1*
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Dauco carotae - Melilotion albi Görs 1966</i>	Friches et végétations rudérales	45	1 117 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
446		2	1 712 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	1 027 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	40	685 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
447		2	41 443 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	40	16 577 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	16 577 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	20	8 289 m²	NE	NE	2130-4*
448		2	2 693 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	2 020 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	673 m²	NE	2	2130-1*
449		2	7 060 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	6 001 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	15	1 059 m²	NE	2	2160-1
450		2	6 644 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	6 644 m²	NE	1	2160-1
451	Tvx	2	1 383 m²	U	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	1 383 m²	T	1	2190-3
452		2	1 683 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	55	925 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	45	757 m²	NE	2	2160-1
453	Tvx	2	1 474 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	1 474 m²	NT	2	2190-3
454		2	2 863 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	2 863 m²	NE	1	2160-1
455		2	368 m²	U	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	100	368 m²	NT	2	2120-1
456		2	1 137 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	1 137 m²	NE	1	2160-1
457		2	133 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	133 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
458		2	2 572 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Lemnetaia minoris O. Bolòs & Masclans 1955	Végétations aquatiques - Plans d'eau	40	1 029 m²	NE	NE	3150-4
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Oenanthion aquaticae Hejny ex Neuhäusl 1959	Mégaphorbiaies	30	772 m²	NE	NE	2190-5

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulion sepium Tüxen in Oberd. 1957	Mégaphorbiaies	30	772 m²	NE	2	6430-4
459		2	16 192 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	50	8 096 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	4 048 m²	T	1	2130-1*
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	25	4 048 m²	NE	NE	2130-1*
460	Tvx	2	3 585 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	70	2 509 m²	T	1	2130-4*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	20	717 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	5	179 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 4	Groupement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	5	179 m²	NT	2	2130-1*
461		2	56 290 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	75	42 217 m²	T	1	2180-5
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	14 072 m²	T	1	2160-1
462		2	21 363 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	11 750 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	20	4 273 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	4 273 m²	NE	2	2130-1*
				Hab. 4	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	5	1 068 m²	NE	NE	2120-1
463		2	13 027 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	85	11 073 m²	NE	NE	2180-1
				Hab. 2	Ophioglosso vulgati - Calamagrostietum epigeji V. Westh. & Segal 1961	Végétations amphibies et de bas-marais	15	1 954 m²	NE	2	2190-3
464		2	10 301 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	55	5 666 m²	NE	NE	2180-1
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	45	4 635 m²	NE	2	2160-1
465	Tvx	2	5 222 m²	Hab. 1	<i>Communauté dunaire à Carex flacca et Euphrasia nemorosa</i>	Prairies hygroclines à hygrophiles	97	5 065 m²	NT	NE	6510-?
				Hab. 2	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	3	157 m²	NT	2	2190-2
466	Tvx	2	5 122 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	90	4 610 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	3	154 m²	NT	3	2160-1
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	3	154 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 4	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Laguro ovati - Bromion rigidi Géhu & Géhu-Franck ex Géhu in Bardat et al. 2004</i>	Pelouses dunaires	2	102 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 5	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	2	102 m²	NT	2	2130-4*
467	Tvx	2	1 178 m²	U	Groupeement dunaire à Hieracium umbellatum et Carex arenaria (Duhamel 1994) Duhamel in Mora et al. 2009 nom. ined.	Ourllets et Prairies	100	1 178 m²	T	1	2130-4*
468		2	14 338 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	14 338 m²	NE	1	2160-1
469		2	7 684 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	55	4 226 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	45	3 458 m²	NE	2	2130-1*
470		2	3 098 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	70	2 168 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	20	620 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	310 m²	NE	2	2130-1*
471		2	217 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	163 m²	NE	1	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	54 m²	NE	2	2130-1*
472		2	1 395 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	1 046 m²	NE	1	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	349 m²	NE	2	2130-1*
473		2	515 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	437 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Groupeement dunaire à Carex arenaria et Betula pendula Duhamel 2009	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	15	77 m²	NE	1	2180-1
474		2	977 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	977 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
475		2	2 681 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	2 681 m²	NE	1	2160-1
476		2	4 858 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	4 129 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Groupeement dunaire à Carex arenaria et Betula pendula Duhamel 2009	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	15	729 m²	NE	1	2180-1
477		2	434 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	434 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
478		2	931 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	55	512 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	45	419 m²	NE	1	2120-1
479	Tvx	2	10 106 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	55	5 558 m²	NT	2	2130-4*
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	2 021 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 3	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	15	1 516 m²	NT	3	2160-1
				Hab. 4	Groupeement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	8	808 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 5	<i>Groupeement à Bromus tectorum & Silene conica (Duhamel 1994) Duhamel 2009</i>	Pelouses dunaires	2	202 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
480		2	1 020 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	561 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	20	204 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	204 m²	NE	2	2130-1*
				Hab. 4	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	5	51 m²	NE	NE	2120-1
481		2	167 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	167 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
482		2	1 586 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Lemnitalia minoris O. Bolòs & Masclans 1955	Végétations aquatiques - Plans d'eau	40	634 m²	NE	NE	3150-4
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Oenanthion aquaticae Hejny ex Neuhausl 1959	Mégaphorbiaies	30	476 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulion sepium Tüxen in Oberd. 1957	Mégaphorbiaies	30	476 m²	NE	2	6430-4
483		2	340 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	340 m²	NT	3	2160-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
484		2	2 454 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	2 454 m²	NT	3	2160-1
485		2	515 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	70	361 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	20	103 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	52 m²	NE	2	2130-1*
486		2	4 409 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	3 747 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Groupe ment dunaire à Carex arenaria et Betula pendula Duhamel 2009	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	15	661 m²	NE	1	2180-1
487		2	336 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	75	252 m²	NE	NE	2180-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	25	84 m²	NE	NE	2160-1
488		2	117 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	100	117 m²	NE	2	2120-1
489		2	130 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	130 m²	T	2	2130-1*
490		2	578 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	578 m²	T	2	2130-1*
491		2	766 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	55	421 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulo arvensis - Agropyron repentis Görs 1966	Friches et végétations rudérales	45	345 m²	NE	NI	NI
492		2	6 100 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	4 575 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Beto maritimae - Atriplicetum laciniatae Tüxen (1950) 1967	Dune bordière	25	1 525 m²	NE	2	1210-1
493		2	2 913 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	55	1 602 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	45	1 311 m²	NE	1	2120-1
494		2	1 507 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	75	1 130 m²	NE	NE	2180-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	25	377 m²	NE	NE	2160-1
495		2	922 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	55	507 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	45	415 m²	NE	1	2120-1
496		2	8 979 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	7 632 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	15	1 347 m²	NE	2	2160-1
497		2	712 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	712 m²	NE	1	2160-1
498		2	749 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	75	562 m²	NE	NE	2180-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	25	187 m²	NE	NE	2160-1
499		2	7 348 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	55	4 041 m²	NE	NE	2180-1
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	45	3 306 m²	NE	2	2160-1
500		2	225 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	225 m²	NE	NI	NI
501		2	12 872 m²	Hab. 1	Groupe ment dunaire à Carex arenaria et Betula pendula Duhamel 2009	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	75	9 654 m²	NT	2	2180-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	3 218 m²	T	1	2160-1
502	Tvx	2	1 288 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	70	901 m²	NT	2	2130-4*
				Hab. 2	Groupe ment à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	10	129 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Onopordetalia acanthii Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadac 1944	Friches et végétations rudérales	10	129 m²	NT	NI	NI
				Hab. 4	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	10	129 m²	NT	2	2160-1
503		2	231 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	231 m²	T	2	2130-1*
504		2	40 835 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	30 626 m²	NT	1	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	10 209 m²	NT	2	2130-1*
505		2	1 768 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	1 503 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Groupe ment dunaire à Carex arenaria et Betula pendula Duhamel 2009	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	15	265 m²	NE	1	2180-1
506		2	19 961 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	14 970 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	25	4 990 m²	NE	NI	NI
507		2	831 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	831 m²	NE	NI	NI
508		2	2 098 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	2 098 m²	T	2	2130-1*
509		2	2 971 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	2 971 m²	T	2	2130-1*
510		2	207 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	207 m²	NE	1	2160-1
511		2	2 600 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	2 210 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Groupe ment dunaire à Carex arenaria et Betula pendula Duhamel 2009	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	15	390 m²	NE	1	2180-1
512		2	9 701 m²	U	Groupe ment dunaire à Carex arenaria et Betula pendula Duhamel 2009	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	9 701 m²	NE	1	2180-1
513		2	3 736 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	3 736 m²	NE	NI	NI
514		2	269 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	269 m²	T	2	2130-1*
515		2	6 072 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Estran	100	6 072 m²	NE	NI	NI
516		2	7 592 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	7 592 m²	NE	NI	NI
517	Tvx	2	830 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Onopordetalia acanthii Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadac 1944	Friches et végétations rudérales	50	415 m²	NE	NI	NI
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	20	166 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	20	166 m²	NT	NI	NI
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Laguro ovati - Bromion rigidi Géhu & Géhu-Franck ex Géhu in Bardat et al. 2004	Pelouses dunaires	10	83 m²	NE	NI	NI
518		2	228 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	228 m²	T	2	2130-1*
519		2	61 089 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	33 599 m²	NT	2	2120-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	45	27 490 m²	NT	2	2120-1
520		2	13 542 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	11 510 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	15	2 031 m²	NE	NE	2120-1
521		2	54 500 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	50	27 250 m²	NE	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	21 800 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	5	2 725 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	5	2 725 m²	NE	NE	2130-4*
522		2	12 454 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	10 586 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	15	1 868 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
523	Tvx	2	10 131 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	90	9 118 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	10	1 013 m²	NT	2	2160-1
524		2	1 811 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	50	905 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	453 m²	NE	2	2130-1*
				Hab. 3	Groupement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	25	453 m²	NE	NE	2130-1*
525		2	2 726 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	50	1 363 m²	NE	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	1 090 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	5	136 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	5	136 m²	NE	NE	2130-4*
526	Tvx	2	953 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Onopordetalia acanthii Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadac 1944</i>	Friches et végétations rudérales	90	858 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	10	95 m²	NT	3	2130-1*
527		2	1 196 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	50	598 m²	NE	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	479 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	5	60 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	5	60 m²	NE	NE	2130-4*
528	Tvx	2	2 615 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Onopordetalia acanthii Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadac 1944</i>	Friches et végétations rudérales	95	2 484 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	5	131 m²	NT	3	2130-1*
529		2	42 645 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	50	21 323 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	10 661 m²	NE	2	2130-1*
				Hab. 3	Groupement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	25	10 661 m²	NE	NE	2130-1*
530		2	43 198 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	50	21 599 m²	NE	1	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	40	17 279 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	5	2 160 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 4	Groupement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	5	2 160 m²	NE	NE	2130-1*
531		2	402 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	55	221 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	45	181 m²	NE	NE	2130-4*
532	Tvx	2	1 427 m²	U	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	1 427 m²	T	2	2190-3
533		2	8 392 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	7 133 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	15	1 259 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
534		2	924 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	693 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	25	231 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
535		2	1 530 m²	U	<i>Végétation arbustive à arborescente, à peupliers divers (Populus div. sp.), plantée ou colonisant la xérosère</i>	Boisements de substitution	100	1 530 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
536		2	3 612 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	3 071 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	15	542 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
537		2	6 556 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	3 606 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	45	2 950 m²	NT	2	2120-1
538		2	21 906 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	16 429 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	5 476 m²	NE	2	2130-1*
539		2	1 246 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	1 246 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
540		2	12 367 m²	Hab. 1	<i>Groupement à Bromus tectorum & Silene conica (Duhamel 1994) Duhamel 2009</i>	Pelouses dunaires	85	10 512 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	1 855 m²	NE	2	2130-1*
541		2	598 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	598 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
542		2	6 713 m²	U	Groupeement dunaire à Carex arenaria et Betula pendula Duhamel 2009	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	6 713 m²	NE	2	2180-1
543		2	879 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	879 m²	NT	2	2130-1*
544		2	997 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	997 m²	NT	3	2130-1*
545		2	80 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978 - faciès à Tremble	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	75	60 m²	NE	NE	2180-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	25	20 m²	NE	1	2180-1
546	P01	2	2 114 m²	Hab. 1	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	30	634 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 2	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	30	634 m²	T	1	2190-3
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Phragmition communis W. Koch 1926	Roselières	10	211 m²	NT	2	2190-5

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
				Hab. 4	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	9	190 m²	T	1	2160-1
				Hab. 5	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	9	190 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 6	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	9	190 m²	T	1	2180-1
				Hab. 7	Groupeement à Potamogeton gramineus et characées Duhamel 1995 nom. ined.	Végétations aquatiques - Plans d'eau	3	63 m²	T	1	2190-1
547		2	591 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	591 m²	NE	NI	NI
548		2	1 888 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	55	1 038 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	849 m²	NE	2	2160-1
549		3	8 295 m²	U	Zone anthropisée	Milieux anthropisés	100	8 295 m²	NE	NI	NI
550		3	557 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	557 m²	NT	3	2120-1
551		3	7 748 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	55	4 261 m²	T	1	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	3 487 m²	NT	2	2160-1
552		3	1 717 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 717 m²	NT	3	2120-1
553		3	779 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	65	506 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	35	273 m²	NE	NI	NI
554		3	681 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	681 m²	T	2	2160-1
555		3	2 358 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	2 358 m²	NT	2	2120-1
556		3	336 m²	Hab. 1	Samolo valerandi - Eleocharitetum quinqueflorae Julve 1992 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	55	185 m²	NE	2	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	45	151 m²	NE	2	2190-3
557		3	265 m²	Hab. 1	Samolo valerandi - Eleocharitetum quinqueflorae Julve 1992 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	55	146 m²	NE	2	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	45	119 m²	NE	2	2190-3
558		3	459 m²	Hab. 1	Samolo valerandi - Eleocharitetum quinqueflorae Julve 1992 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	55	253 m²	NE	2	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	45	207 m²	NE	2	2190-3
559		3	155 m²	Hab. 1	Beto maritimae - Atriplicetum laciniatae Tüxen (1950) 1967	Dune bordière	65	101 m²	NT	3	1210-1
				Hab. 2	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	35	54 m²	NE	NI	NI
560		3	8 546 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	8 546 m²	NE	NI	NI
561		3	3 733 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	3 733 m²	NT	3	2120-1
562		3	1 881 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	1 881 m²	T	2	2160-1
563		3	9 141 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	9 141 m²	NE	NE	2180-1
564		3	815 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	611 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	25	204 m²	NE	NE	2120-1
565		3	6 816 m²	Hab. 1	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	75	5 112 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	1 704 m²	NE	2	2120-1
566		3	12 536 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	12 536 m²	T	3	2160-1
567		3	1 384 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	1 384 m²	NE	NI	NI
568		3	2 197 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	2 197 m²	NT	3	2120-1
569		3	1 474 m²	U	Non prospecté	Milieux anthropisés	100	1 474 m²	NE	NI	NI
570		3	50 693 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	85	43 089 m²	T	1	2180-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	15	7 604 m²	NE	NE	2190-3
571		3	819 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	65	532 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	35	287 m²	NE	NI	NI
572		3	123 m²	U	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	100	123 m²	NT	2	2120-1
573		3	13 260 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	13 260 m²	T	3	2160-1
574	P13	3	1 259 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov	Fourrés dunaires	100	1 259 m²	T	NI	NI
575		3	1 139 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	854 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	25	285 m²	NE	NE	2120-1
576	P14	3	1 440 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov	Fourrés dunaires	100	1 440 m²	T	NI	NI
577		3	645 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	645 m²	NT	2	2120-1
578		3	863 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	863 m²	NT	3	2120-1
579	P15	3	1 050 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov	Fourrés dunaires	1	11 m²	T	NI	NI
				Hab. 2	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	3	32 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 3	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	3	32 m²	NT	3	2190-2
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov	Fourrés dunaires	10	105 m²	T	NI	NI
				Hab. 5	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	10	105 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 6	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	10	105 m²	NT	3	2190-2
				Hab. 7	Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	10	105 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 8	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	53	557 m²	T	3	2160-1
580		3	12 417 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	12 417 m²	NT	2	2160-1
581		3	7 751 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	55	4 263 m²	T	1	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	3 488 m²	NT	2	2160-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
582	P04	3	1 452 m²	Hab. 1	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	50	726 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	50	726 m²	T	3	2160-1
583		3	2 325 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	2 325 m²	NE	2	2130-1*
584		3	5 890 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	75	4 417 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	25	1 472 m²	NE	NE	2130-1*
585		3	9 921 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	65	6 449 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	3 472 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
586		3	7 573 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	7 573 m²	T	1	2160-1
587		3	1 444 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 444 m²	NT	3	2120-1
588		3	171 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	171 m²	NT	3	2120-1
589		3	798 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	75	598 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	25	199 m²	NE	NE	2130-1*
590		3	4 028 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	65	2 619 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	35	1 410 m²	NT	2	2130-1*
591		3	15 622 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978 - faciès à Tremble	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	15 622 m²	NE	2	2180-5
592		3	1 326 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	40	530 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	30	398 m²	T	2	2120-1
				Hab. 3	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	30	398 m²	NT	2	2160-1
593		3	336 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	336 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
594		3	204 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	204 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
595		3	1 801 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	1 351 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	25	450 m²	NE	NE	2120-1
596		3	170 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	170 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
597		3	10 526 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	10 526 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
598		3	1 132 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 132 m²	NT	2	2120-1
599		3	18 419 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	18 419 m²	NT	3	2120-1
600		3	148 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	148 m²	NT	2	2130-1*
601		3	40 088 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	40 088 m²	T	1	2160-1
602		3	4 992 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	50	2 496 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	50	2 496 m²	T	1	2160-1
603	Tvx	3	2 531 m²	U	<i>Non prospecté</i>	Milieux anthropisés	100	2 531 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
604	P11	3	493 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	67	330 m²	T	2	2160-1
				Hab. 2	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	33	163 m²	NT	2	2190-2
605		3	1 685 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	85	1 432 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	15	253 m²	NT	2	2160-1
606		3	449 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	449 m²	NE	2	2160-1
607		3	671 m²	Hab. 1	Beto maritimae - Atriplicetum laciniatae Tüxen (1950) 1967	Dune bordière	65	436 m²	NT	3	1210-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	235 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
608		3	896 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	896 m²	NT	2	2160-1
609		3	4 775 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	4 775 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
610		3	225 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	225 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
611		3	7 004 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	7 004 m²	NT	3	2120-1
612		3	192 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	192 m²	T	1	2160-1
613		3	165 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	165 m²	NT	2	2160-1
614		3	9 095 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	85	7 730 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	15	1 364 m²	NT	2	2160-1
615		3	9 597 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	9 597 m²	T	2	2120-1
616		3	1 163 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	1 163 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
617		3	2 242 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	2 242 m²	T	1	2160-1
618	P16	3	45 707 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov</i>	Fourrés dunaires	50	22 853 m²	T	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	8	3 657 m²	T	1	2160-1
				Hab. 3	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	8	3 657 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 4	Samolo valerandi - Eleocharitetum quinqueflorae Julve 1992 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	8	3 657 m²	T	1	2190-3
				Hab. 5	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	8	3 657 m²	T	1	2190-3
				Hab. 6	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	8	3 657 m²	T	1	2180-1
				Hab. 7	Communauté basale à Juncus articulatus	Roselières	2	914 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 8	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	2	914 m²	NT	2	2190-2
				Hab. 9	Groupeement à Potamogeton gramineus et characées Duhamel 1995 nom. ined.	Végétations aquatiques - Plans d'eau	2	914 m²	T	1	2190-1
				Hab. 10	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Phragmition communis W. Koch 1926	Roselières	1	457 m²	NT	2	2190-5

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
				Hab. 11	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	1	457 m²	NT	2	2190-2
				Hab. 12	Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	1	457 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 13	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	1	457 m²	NT	2	2190-2
619		3	1 685 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	927 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	758 m²	NT	2	2160-1
620		3	2 008 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	55	1 104 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	904 m²	NE	1	2160-1
621		3	1 390 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	1 042 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Groupement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	25	347 m²	NE	NE	2130-1*
622	Tvx	3	1 950 m²	Hab. 1	<i>Communauté dunaire à Carex flacca et Euphrasia nemorosa</i>	Prairies hygroclines à hygrophiles	95	1 852 m²	NT	NE	6510-?
				Hab. 2	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	3	58 m²	NT	2	2190-2
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	2	39 m²	NT	2	2130-1*
623	P17	3	3 269 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	40	1 308 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	40	1 308 m²	T	1	2190-3
				Hab. 3	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	7	229 m²	NT	2	2190-2
				Hab. 4	Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	5	163 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 5	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	5	163 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 6	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	3	98 m²	NT	2	2190-3
624		3	603 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	100	603 m²	NE	NE	2130-1*
625		3	42 548 m²	Hab. 1	<i>Végétation arborescente à base de pins divers (Pinus div. sp.), plantés ou colonisant la xérosère</i>	Boisements de substitution	85	36 166 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	15	6 382 m²	NE	NE	2130-1*
626		3	409 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	409 m²	NT	3	2130-1*
627		3	1 126 m²	U	<i>Plan d'eau non végétalisé</i>	Végétations aquatiques - Plans d'eau	100	1 126 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
628		3	4 043 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	4 043 m²	NT	2	2160-1
629		3	1 040 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	1 040 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
630		3	730 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	730 m²	NE	2	2160-1
631		3	1 078 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	1 078 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
632		3	4 801 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	85	4 081 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	15	720 m²	NT	2	2160-1
633		3	868 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	868 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
634		3	2 861 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	65	1 860 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	35	1 001 m²	T	1	2130-1*
635		3	3 396 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	3 396 m²	T	1	2160-1
636		3	425 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	425 m²	NT	3	2120-1
637	Tvx	3	868 m²	U	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	868 m²	NT	1	2190-3
638	Tvx	3	2 882 m²	Hab. 1	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	90	2 594 m²	NT	1	2190-3
				Hab. 2	<i>Communauté dunaire à Carex flacca et Euphrasia nemorosa</i>	Prairies hygroclines à hygrophiles	10	288 m²	NT	2	6510-?
639		3	54 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	54 m²	T	1	2160-1
640		3	1 063 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	100	1 063 m²	NE	NE	2130-1*
641		3	1 415 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	1 415 m²	NT	3	2130-1*
642		3	2 085 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	2 085 m²	T	1	2160-1
643		3	1 120 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	1 120 m²	T	1	2160-1
644		3	5 303 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	55	2 917 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	2 386 m²	NE	2	2160-1
645		3	6 054 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	55	3 330 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	45	2 724 m²	NT	2	2120-1
646		3	794 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	794 m²	NE	2	2160-1
647		3	4 216 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	4 216 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
648		3	542 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	542 m²	NT	3	2120-1
649		3	6 741 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	40	2 696 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	60	4 045 m²	NT	2	2160-1
650		3	1 915 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 915 m²	NE	1	2120-1
651		3	676 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	676 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
652		3	52 309 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	39 232 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	13 077 m²	T	2	2130-1*
653	Tvx	3	2 571 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	60	1 543 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	30	771 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 3	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	5	129 m²	NT	2	2190-2
				Hab. 4	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	5	129 m²	NT	2	2130-1*

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
654	Tvx	3	6 402 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	6 402 m²	NT	1	2130-1*
655	Tvx	3	4 907 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	4 907 m²	T	1	2160-1
656		3	817 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	55	449 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	368 m²	NE	2	2160-1
657		3	189 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	189 m²	NE	2	2130-1*
658		3	434 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	434 m²	T	1	2180-5
659		3	2 982 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	85	2 535 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	15	447 m²	NT	2	2160-1
660		3	38 078 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	38 078 m²	NT	2	2160-1
661		3	7 503 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	85	6 378 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	15	1 125 m²	NT	2	2160-1
662		3	6 949 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	6 949 m²	NT	3	2120-1
663		3	5 385 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	5 385 m²	T	1	2160-1
664		3	91 m²	U	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	100	91 m²	T	1	2120-1
665		3	13 422 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	13 422 m²	T	1	2160-1
666	P19	3	16 134 m²	Hab. 1	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	55	8 873 m²	T	3	2190-3
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	30	4 840 m²	T	3	2160-1
				Hab. 3	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov</i>	Fourrés dunaires	15	2 420 m²	T	NI	NI
667		3	30 232 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	12 093 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	30	9 069 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 3	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	30	9 069 m²	NT	2	2120-1
668	P21	3	1 046 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	95	994 m²	T	2	2160-1
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov</i>	Fourrés dunaires	5	52 m²	T	NI	NI
669		3	18 537 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	50	9 268 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	50	9 268 m²	NE	NI	NI
670		3	1 324 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	530 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	30	397 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 3	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	30	397 m²	NT	2	2120-1
671	P22	3	1 298 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	1 298 m²	T	2	2160-1
672	Tvx	3	5 237 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	94	4 923 m²	T	1	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	5	262 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 3	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	1	52 m²	NT	2	2160-1
673	Tvx	3	1 378 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	80	1 102 m²	T	1	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	20	276 m²	NT	2	2160-1
674	Tvx	3	9 963 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	95	9 465 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	5	498 m²	NT	3	2130-1*
675	Tvx	3	4 633 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	40	1 853 m²	NT	2	2130-4*
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Atropetalia belladonnae J. Vlieger 1937</i>	Friches et végétations rudérales	40	1 853 m²	NE	NI	NI
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	20	927 m²	NT	3	2130-1*
676		3	5 702 m²	Hab. 1	Groupe ment dunaire à Carex arenaria et Betula pendula Duhamel 2009	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	75	4 276 m²	NE	1	2180-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	25	1 425 m²	NE	NE	2130-4*
677		3	3 867 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	3 867 m²	NE	2	2130-1*
678		3	189 m²	U	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	100	189 m²	T	1	2190-2
679		3	1 972 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	1 972 m²	NE	NI	NI
680		3	2 250 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	2 250 m²	NT	2	2160-1
681	Tvx	3	3 356 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	70	2 349 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	28	940 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	2	67 m²	NT	2	2130-1*
682	Tvx	3	480 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	480 m²	T	1	2160-1
683	Tvx	3	1 452 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	90	1 307 m²	T	1	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	10	145 m²	NT	2	2160-1
684	Tvx	3	11 932 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	90	10 739 m²	NT	1	2130-4*
				Hab. 2	Groupe ment à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	10	1 193 m²	NT	1	2130-1*
685		3	353 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	353 m²	NE	2	2130-1*
686		3	149 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	149 m²	NE	2	2130-1*
687		3	1 580 m²	U	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	100	1 580 m²	T	1	2190-2
688		3	11 792 m²	U	<i>Plan d'eau non végétalisé</i>	Végétations aquatiques - Plans d'eau	100	11 792 m²	NE	NI	NI
689		3	1 571 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	1 178 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	393 m²	NE	1	2120-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
690		3	5 776 m²	Hab. 1	Végétation arborescente à base de pins divers (Pinus div. sp.), plantés ou colonisant la xérosère	Boisements de substitution	85	4 909 m²	NE	NI	NI
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	15	866 m²	NE	NE	2130-1*
691	P20	3	5 113 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	5 113 m²	NT	3	2120-1
692		3	1 856 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	59	1 095 m²	T	3	2160-1
				Hab. 2	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	20	371 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 3	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	20	371 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 4	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	1	19 m²	NT	3	2190-2
693		3	258 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	142 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	45	116 m²	T	2	2130-1*
694		3	1 208 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 208 m²	NT	3	2120-1
695		3	605 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	50	302 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 2	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	50	302 m²	NE	NI	NI
696		3	154 m²	U	Groupement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	100	154 m²	NE	NE	2130-1*
697		3	887 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	55	488 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	399 m²	NE	2	2160-1
698		3	633 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulion sepium Tüxen in Oberd. 1957	Mégaphorbiaies	100	633 m²	NE	NE	6430-4
699		3	812 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	812 m²	NT	2	2160-1
700		3	6 129 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	6 129 m²	NE	1	2130-1*
701		3	9 739 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	7 305 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	2 435 m²	NT	2	2160-1
702		3	10 088 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	10 088 m²	NT	3	2120-1
703		3	1 773 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	1 773 m²	T	1	2160-1
704		3	187 m²	U	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	100	187 m²	T	2	2120-1
705		3	666 m²	U	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	100	666 m²	T	2	2120-1
706		3	1 427 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	1 070 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	357 m²	NT	2	2120-1
707		3	2 494 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	2 494 m²	NT	2	2160-1
708		3	3 292 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	3 292 m²	NT	2	2160-1
709	P26	3	936 m²	Hab. 1	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	88	823 m²	T	3	2190-3
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	3	28 m²	T	3	2160-1
				Hab. 3	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	3	28 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 4	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	3	28 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 5	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov	Fourrés dunaires	3	28 m²	T	NI	NI
710	P25	3	2 375 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	77	1 828 m²	T	3	2160-1
				Hab. 2	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	10	237 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 3	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	10	237 m²	T	3	2190-3
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov	Fourrés dunaires	3	71 m²	T	NI	NI
711		3	1 217 m²	U	Groupement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	100	1 217 m²	NE	NE	2130-1*
712		3	1 000 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	750 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Groupement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	25	250 m²	NE	NE	2130-1*
713		3	29 559 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	22 169 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	7 390 m²	NE	1	2120-1
714		3	2 305 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	2 305 m²	NE	NI	NI
715		3	1 624 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	1 624 m²	T	1	2160-1
716		3	1 037 m²	U	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	100	1 037 m²	T	2	2120-1
717		3	250 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	250 m²	NT	3	2120-1
718		3	801 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	60	480 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	40	320 m²	T	2	2130-1*
719		3	15 596 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	8 578 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	45	7 018 m²	T	2	2130-1*
720		3	2 157 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	1 618 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	539 m²	NT	2	2120-1
721		3	4 909 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	60	2 945 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	30	1 473 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 3	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	10	491 m²	NT	2	2120-1
722		3	1 252 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	1 252 m²	NT	2	2160-1
723		3	46 638 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	50	23 319 m²	T	1	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	20 987 m²	T	1	2160-1
				Hab. 3	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	5	2 332 m²	NT	2	2120-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
724	P27	3	255 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	95	242 m²	T	2	2160-1
				Hab. 2	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvern. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	5	13 m²	NT	2	2190-3
725		3	32 044 m²	Hab. 1	Végétation arborescente à base de pins divers (Pinus div. sp.), plantés ou colonisant la xérosère	Boisements de substitution	85	27 238 m²	NE	NI	NI
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	15	4 807 m²	NE	NE	2130-1*
726		3	874 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictrum flavum - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	100	874 m²	NE	NE	2190-5
727		3	530 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanquet & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	79 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	85	450 m²	NE	NI	NI
728		3	7 689 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanquet & R. Tüxen 1952	Dune bordière	60	4 613 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanquet & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	40	3 076 m²	T	2	2130-1*
729		3	1 227 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanquet & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	184 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	85	1 043 m²	NE	NI	NI
730		3	1 125 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanquet & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	619 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoides Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	506 m²	NT	2	2160-1
731		3	857 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanquet & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	50	429 m²	T	1	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoides Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	386 m²	T	2	2160-1
				Hab. 3	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanquet & R. Tüxen 1952	Dune bordière	5	43 m²	NT	2	2120-1
732		3	2 610 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanquet & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	50	1 305 m²	T	1	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoides Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	1 175 m²	T	2	2160-1
				Hab. 3	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanquet & R. Tüxen 1952	Dune bordière	5	131 m²	NT	2	2120-1
733		3	1 004 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	1 004 m²	NE	NI	NI
734		3	1 749 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanquet & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	55	962 m²	NE	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoides Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	787 m²	NE	2	2160-1
735	P30	3	686 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoides J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	66	453 m²	T	3	2160-1
				Hab. 2	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	3	21 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 3	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvern. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	15	103 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 4	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanquet & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	15	103 m²	T	3	2190-3
				Hab. 5	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	1	7 m²	NT	3	2190-2
736		3	65 899 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoides Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	80	52 719 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanquet & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	6 590 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	Groupe à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	10	6 590 m²	NE	NE	2130-1*
737		3	3 857 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoides Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	2 892 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Groupe à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	25	964 m²	NE	NE	2130-1*
738		3	812 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoides Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	609 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanquet & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	203 m²	T	2	2130-1*
739		3	2 679 m²	Hab. 1	Groupe à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	75	2 010 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranium sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	25	670 m²	NE	NE	2130-4*
740		3	1 395 m²	U	Groupe dunaire à Carex arenaria et Betula pendula Duhamel 2009	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 395 m²	T	1	2180-1
741		3	10 578 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanquet & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	8 991 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	15	1 587 m²	NE	1	2120-1
742		3	1 269 m²	Hab. 1	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoides (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	75	952 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanquet & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	317 m²	NE	2	2120-1
743		3	606 m²	U	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	100	606 m²	NE	NI	NI
744		3	842 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978 - faciès à Tremble	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	842 m²	NE	2	2180-5
745		3	609 m²	Hab. 1	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanquet & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	55	335 m²	NE	2	2190-3
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoides J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	45	274 m²	NE	2	2160-1
746		3	47 512 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanquet & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	7 127 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 2	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	85	40 385 m²	NE	NI	NI
747	P29	3	937 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoides J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	40	375 m²	T	3	2160-1
				Hab. 2	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvern. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	40	375 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 3	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	19	178 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 4	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	1	9 m²	NT	3	2190-2
748		3	732 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanquet & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	183 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanquet & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	183 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 3	Sables dunaires secs non végétalisés	Dune bordière	50	366 m²	NE	NI	NI
749		3	916 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanquet & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	50	458 m²	T	1	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoides Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	412 m²	T	2	2160-1
				Hab. 3	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanquet & R. Tüxen 1952	Dune bordière	5	46 m²	NT	2	2120-1
750		3	497 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoides Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	80	398 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanquet & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	50 m²	NT	3	2130-1*

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
				Hab. 3	Groupe ment à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	10	50 m²	NE	NE	2130-1*
751		3	2 196 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	80	1 757 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	220 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	Groupe ment à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	10	220 m²	NE	NE	2130-1*
				U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	90 m²	T	2	2160-1
753		3	295 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	295 m²	NE	2	2160-1
754	P32	3	107 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	107 m²	T	2	2160-1
755		3	872 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	872 m²	T	2	2120-1
756	P31	3	1 802 m²	Hab. 1	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	32	577 m²	NT	2	2190-2
				Hab. 2	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	32	577 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 3	Ophioglosso vulgati - Calamagrostietum epigeji V. Westh. & Segal 1961	Végétations amphibies et de bas-marais	10	180 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 4	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	10	180 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 5	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	10	180 m²	T	1	2190-3
				Hab. 6	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	3	54 m²	T	1	2160-1
				Hab. 7	Groupe ment à Potamogeton gramineus et characées Duhamel 1995 nom. ined.	Végétations aquatiques - Plans d'eau	3	54 m²	T	1	2190-1
757		3	143 m²	Hab. 1	<i>Végétation arborescente à base de pins divers (Pinus div. sp.), plantés ou colonisant la xérosère</i>	Boisements de substitution	85	122 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	15	21 m²	NE	NE	2130-1*
758		3	1 359 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 359 m²	NT	3	2120-1
759		3	2 977 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	2 531 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	15	447 m²	NE	2	2160-1
760		3	299 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	299 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
761		3	211 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	40	84 m²	T	2	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	21 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	50	106 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
762		3	380 m²	U	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	100	380 m²	NT	3	2120-1
763		3	200 m²	U	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	100	200 m²	NT	3	2120-1
764		3	16 062 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	50	8 031 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	45	7 228 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 3	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	5	803 m²	NT	2	2120-1
765		3	2 646 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	80	2 117 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	265 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	Groupe ment à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	10	265 m²	NE	NE	2130-1*
766		3	5 486 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	65	3 566 m²	T	2	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	15	823 m²	NE	2	2130-4*
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	823 m²	NE	2	2130-1*
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	5	274 m²	NE	2	2190-3
767	P34	3	1 694 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	32	542 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	32	542 m²	T	1	2190-3
				Hab. 3	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	3	51 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 4	Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	14	237 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 5	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	15	254 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 6	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	1	17 m²	NT	2	2190-2
				Hab. 7	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	3	51 m²	T	1	2180-1
768		3	25 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	25 m²	NE	2	2160-1
769		3	535 m²	U	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	100	535 m²	NE	NE	6510-4
770		3	3 496 m²	Hab. 1	Groupe ment à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	85	2 972 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	15	524 m²	NT	2	2160-1
771		3	87 688 m²	Hab. 1	<i>Végétation arborescente à base de pins divers (Pinus div. sp.), plantés ou colonisant la xérosère</i>	Boisements de substitution	85	74 535 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	15	13 153 m²	NE	NE	2130-1*
772		3	11 439 m²	U	<i>Végétation arbustive à arborescente, à peupliers divers (Populus div. sp.), plantée ou colonisant la xérosère</i>	Boisements de substitution	100	11 439 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
773		3	7 598 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	5 699 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	1 900 m²	T	2	2130-1*
774		3	3 973 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	596 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	85	3 377 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
775		3	2 347 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	1 760 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 2	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	25	587 m²	NE	3	2160-1
776		3	2 111 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	2 111 m²	NT	3	2120-1
777	P50	3	827 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	827 m²	T	2	2160-1
778		3	268 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	50	134 m²	NE	NE	2190-3

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
779		3	332 m²	Hab. 2	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	45	121 m²	NE	2	2190-3
				Hab. 3	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	5	13 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	50	166 m²	NE	3	2130-1*
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	45	149 m²	NT	3	2120-1
780		3	754 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	754 m²	T	2	2120-1
781		3	135 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	135 m²	T	2	2120-1
782	P35	3	1 483 m²	Hab. 1	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	46	682 m²	T	3	2190-3
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	18	267 m²	T	3	2160-1
				Hab. 3	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	18	267 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	18	267 m²	T	3	2180-1
783		3	1 543 m²	U	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	100	1 543 m²	NE	NE	6510-4
784	P36	3	666 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	85	566 m²	T	3	2160-1
				Hab. 2	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	15	100 m²	NT	3	2190-3
785		3	1 079 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	917 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Groupe ment à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	15	162 m²	NE	NE	2130-1*
786		3	444 m²	U	Groupe ment à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	100	444 m²	NE	NE	2130-1*
787		3	605 m²	U	Beto maritimae - Atriplicetum laciniatae Tüxen (1950) 1967	Dune bordière	100	605 m²	NT	2	1210-1
788		3	4 907 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	4 907 m²	T	2	2120-1
789		3	679 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	510 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	170 m²	T	1	2130-1*
790		3	984 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	984 m²	T	2	2130-1*
791		3	985 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	985 m²	NT	3	2130-1*
792		3	4 308 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	2 585 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	1 723 m²	NT	2	2160-1
793		3	6 117 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	80	4 894 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	612 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	Groupe ment à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	10	612 m²	NE	NE	2130-1*
794	P43	3	4 102 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	50	2 051 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	3	123 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 3	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	23	943 m²	NT	2	2190-2
				Hab. 4	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	23	943 m²	T	1	2190-3
				Hab. 5	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov</i>	Fourrés dunaires	1	41 m²	T	<i>NI</i>	<i>NI</i>
795		3	243 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	243 m²	T	2	2120-1
796	P38	3	4 229 m²	Hab. 1	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	50	2 115 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 2	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	25	1 057 m²	T	1	2190-3
				Hab. 3	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	6	254 m²	T	1	2160-1
				Hab. 4	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	6	254 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 5	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	3	127 m²	NT	2	2190-2
				Hab. 6	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	3	127 m²	NT	2	2190-2
				Hab. 7	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulion sepium Tüxen in Oberd. 1957	Mégaphorbiaies	3	127 m²	NT	2	6430-4
				Hab. 8	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	3	127 m²	T	1	2160-1
				Hab. 9	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	1	42 m²	T	1	2180-1
797	P37	3	1 556 m²	Hab. 1	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	24	374 m²	NT	2	2190-2
				Hab. 2	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	24	374 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 3	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	24	374 m²	T	1	2190-3
				Hab. 4	Groupe ment à Potamogeton gramineus et characées Duhamel 1995 nom. ined.	Végétations aquatiques - Plans d'eau	24	374 m²	T	1	2190-1
				Hab. 5	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	3	47 m²	NT	2	2190-2
				Hab. 6	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	1	16 m²	T	1	2160-1
798		3	2 214 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	2 214 m²	T	1	2180-5
799		3	495 m²	U	Groupe ment à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	100	495 m²	NE	NE	2130-1*
800		3	27 209 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	65	17 686 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	35	9 523 m²	NE	NE	2120-1
801		3	1 687 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Alnion glutinosae Malcuit 1929	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 687 m²	NE	NE	2180-1
802		3	1 155 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	867 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 2	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	25	289 m²	NE	2	2160-1
803		3	2 239 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	2 239 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
804		3	4 005 m²	Hab. 1	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	75	3 004 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	1 001 m²	NE	2	2120-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
805		3	193 m²	U	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	100	193 m²	T	2	2120-1
806		3	73 m²	U	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	100	73 m²	T	2	2120-1
807		3	182 m²	U	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	100	182 m²	T	2	2120-1
808		3	1 664 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	40	666 m²	T	2	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	166 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	50	832 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
809		3	1 589 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	1 191 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	397 m²	T	1	2130-1*
810		3	309 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	309 m²	NE	2	2160-1
811		3	484 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	290 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	194 m²	NT	2	2160-1
812	P44	3	1 435 m²	Hab. 1	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	55	789 m²	T	3	2190-3
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	30	431 m²	T	3	2160-1
				Hab. 3	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	3	43 m²	NT	3	2190-2
				Hab. 4	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	10	144 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 5	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	1	14 m²	NT	3	2190-2
				Hab. 6	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	1	14 m²	NT	3	2190-3
813		3	9 870 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	65	6 415 m²	T	2	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	15	1 480 m²	NE	2	2130-4*
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	1 480 m²	NE	2	2130-1*
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	5	493 m²	NE	2	2190-3
814	P39	3	759 m²	Hab. 1	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	32	243 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 2	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	32	243 m²	T	1	2190-3
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulion sepium Tüxen in Oberd. 1957	Mégaphorbiaies	4	30 m²	NT	2	6430-4
				Hab. 4	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	15	114 m²	T	1	2160-1
				Hab. 5	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov</i>	Fourrés dunaires	15	114 m²	T	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 6	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	1	8 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 7	Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	1	8 m²	NT	2	2190-3
815	P41	3	1 695 m²	Hab. 1	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	21	356 m²	NT	2	2190-2
				Hab. 2	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	21	356 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 3	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	21	356 m²	T	1	2190-3
				Hab. 4	Groupement à Potamogeton gramineus et characées Duhamel 1995 nom. ined.	Végétations aquatiques - Plans d'eau	21	356 m²	T	1	2190-1
				Hab. 5	Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	3	51 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 6	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	3	51 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 7	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	8	136 m²	T	1	2160-1
				Hab. 8	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	1	17 m²	T	1	2160-1
				Hab. 9	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	1	17 m²	T	1	2180-1
816	Tvx	3	3 102 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Mentho longifoliae - Juncion inflexi T. Müll. & Görs ex de Foucault 2008</i>	Prairies hygroclines à hygrophiles	60	1 861 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Groupement dunaire à Euphrasia nemorosa et Luzula campestris	Pelouses dunaires	40	1 241 m²	NT	1	2130-1*
817	Tvx	3	3 353 m²	Hab. 1	Groupement dunaire à Euphrasia nemorosa et Luzula campestris	Pelouses dunaires	85	2 850 m²	NT	1	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	10	335 m²	NT	1	2130-1*
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	5	168 m²	NT	2	2190-3
818		3	7 427 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	7 427 m²	T	1	2180-5
819		3	5 526 m²	Hab. 1	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	55	3 040 m²	NE	1	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	45	2 487 m²	NE	NE	2190-3
820		3	1 088 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	65	707 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	35	381 m²	NE	NE	2120-1
821		3	311 m²	U	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	100	311 m²	T	2	2120-1
822		3	1 554 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	1 166 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 2	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	25	389 m²	NE	2	2160-1
823		3	3 070 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	3 070 m²	T	2	2120-1
824		3	21 093 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	15 820 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	5 273 m²	T	1	2130-1*
825		3	1 075 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	806 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	269 m²	T	1	2130-1*
826	P49	3	706 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	706 m²	T	2	2160-1
827	P47	3	1 208 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	54	653 m²	T	3	2160-1
				Hab. 2	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	15	181 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 3	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	15	181 m²	T	3	2190-3

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	15	181 m²	T	3	2180-1
				Hab. 5	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	1	12 m²	NT	3	2190-2
828		3	31 500 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	80	25 200 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	3 150 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	Groupement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	10	3 150 m²	NE	NE	2130-1*
829	P48	3	694 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	70	486 m²	T	2	2160-1
				Hab. 2	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	30	208 m²	T	2	2190-3
830	P45	3	3 178 m²	Hab. 1	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	55	1 748 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 2	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	30	953 m²	T	1	2190-3
				Hab. 3	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	10	318 m²	T	1	2160-1
				Hab. 4	Centauro littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	3	95 m²	NT	2	2190-2
				Hab. 5	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	1	32 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 6	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov</i>	Fourrés dunaires	1	32 m²	T	<i>NI</i>	<i>NI</i>
831		3	1 740 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	80	1 392 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	174 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	Groupement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	10	174 m²	NE	NE	2130-1*
832	P40	3	487 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	487 m²	T	3	2160-1
833	P42	3	641 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	641 m²	T	3	2160-1
834		3	1 700 m²	U	<i>Plan d'eau non végétalisé</i>	Végétations aquatiques - Plans d'eau	100	1 700 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
835	Txv	3	1 413 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Oenanthion aquaticae Hejny ex Neuhäusl 1959	Mégaphorbiaies	50	706 m²	NT	2	2190-5
				Hab. 2	Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	50	706 m²	NT	2	2190-3
836	Txv	3	6 224 m²	Hab. 1	Groupement dunaire à Euphrasia nemorosa et Luzula campestris	Pelouses dunaires	80	4 979 m²	T	1	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	15	934 m²	T	1	2130-1*
				Hab. 3	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Mentho longifoliae - Juncion inflexi T. Müll. & Görs ex de Foucault 2008</i>	Prairies hygrocines à hygrophiles	5	311 m²	NT	<i>NI</i>	<i>NI</i>
837		3	1 894 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 894 m²	T	1	2180-5
838		3	703 m²	Hab. 1	Groupement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	55	387 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	45	316 m²	NE	NE	2190-3
839		3	1 005 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 005 m²	T	1	2180-5
840		3	852 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	852 m²	NT	2	2160-1
841		3	16 223 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Alnion glutinosae Malcuit 1929	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	16 223 m²	NE	NE	2180-1
842		3	2 263 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	2 263 m²	T	1	2160-1
843		3	1 636 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	65	1 063 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	35	573 m²	NE	NE	2120-1
844		3	6 792 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	65	4 415 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	2 377 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
845		3	1 717 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	1 717 m²	T	1	2160-1
846		3	488 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	293 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	195 m²	NT	2	2160-1
847		3	2 151 m²	U	<i>Végétation arbustive à arborescente, à peupliers divers (Populus div. sp.), plantée ou colonisant la xérosère</i>	Boisements de substitution	100	2 151 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
848	P46	3	3 766 m²	Hab. 1	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	50	1 883 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	25	941 m²	T	1	2160-1
				Hab. 3	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	6	226 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	6	226 m²	T	1	2180-1
				Hab. 5	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	3	113 m²	NT	2	2190-2
				Hab. 6	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	3	113 m²	NT	2	2190-2
				Hab. 7	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	3	113 m²	T	1	2190-3
				Hab. 8	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	3	113 m²	T	1	2160-1
				Hab. 9	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	1	38 m²	T	1	2180-1
849		3	1 445 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	80	1 156 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	145 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	Groupement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	10	145 m²	NE	NE	2130-1*
850	Tvx	3	7 497 m²	U	Groupement dunaire à Euphrasia nemorosa et Luzula campestris	Pelouses dunaires	100	7 497 m²	T	2	2130-1*
851	Txv	3	6 010 m²	Hab. 1	Groupement dunaire à Euphrasia nemorosa et Luzula campestris	Pelouses dunaires	70	4 207 m²	NT	1	2130-1*
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Eleocharitetalia palustris de Foucault 2008</i>	Prairies hygrocines à hygrophiles	20	1 202 m²	NT	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	10	601 m²	NT	1	2130-1*
852	Txv	3	22 699 m²	Hab. 1	Groupement dunaire à Euphrasia nemorosa et Luzula campestris	Pelouses dunaires	70	15 890 m²	T	1	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	20	4 540 m²	T	1	2130-1*
				Hab. 3	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	9	2 043 m²	NT	3	2180-5
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	1	227 m²	NT	2	2190-3

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
853		3	24 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ranunculion aquatilis H. Passarge 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	60	14 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Charetalia hispidae F. Sauer ex Krausch 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	35	8 m²	NE	NE	2190-1
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Potamion polygonifolii Hartog & Segal 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	5	1 m²	NE	NE	2190-1
854		3	5 479 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	100	5 479 m²	NE	NE	2130-4*
855		3	3 208 m²	Hab. 1	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	60	1 925 m²	NE	NE	6510-4
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	40	1 283 m²	NE	NE	2130-4*
856		3	274 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	65	178 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	35	96 m²	NE	NE	2120-1
857		3	250 m²	Hab. 1	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	55	137 m²	NE	1	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	45	112 m²	NE	NE	2190-3
858		3	12 309 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	12 309 m²	T	1	2160-1
859		3	517 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	129 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	75	388 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
860	P51	3	751 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	84	631 m²	T	2	2160-1
				Hab. 2	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	15	113 m²	NT	2	2190-2
				Hab. 3	Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	1	8 m²	NT	2	2190-3
861		3	3 020 m²	Hab. 1	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	70	2 114 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 2	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	20	604 m²	T	2	2190-2
				Hab. 3	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	10	302 m²	NE	3	2190-3
862	Txv	3	14 998 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Mentho longifoliae - Juncion inflexi T. Müll. & Görs ex de Foucault 2008</i>	Prairies hygroclines à hygrophiles	70	10 498 m²	T	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Groupement dunaire à Euphrasia nemorosa et Luzula campestris	Pelouses dunaires	30	4 499 m²	T	1	2130-1*
863		3	1 715 m²	Hab. 1	Groupement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	55	943 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	45	772 m²	NE	NE	2190-3
864		3	6 631 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	6 631 m²	NT	2	2160-1
865		3	249 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	187 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	62 m²	T	2	2130-1*
866		3	13 474 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	55	7 410 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	45	6 063 m²	NT	3	2120-1
867		3	1 840 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	1 104 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	40	736 m²	NT	3	2120-1
868		3	128 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	50	64 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	45	57 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 3	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	5	6 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
869		3	783 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	50	392 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	45	352 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 3	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	5	39 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
870		3	5 162 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	3 097 m²	NE	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	2 065 m²	NE	2	2160-1
871		3	4 571 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	2 742 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	1 828 m²	NT	2	2160-1
872		3	8 670 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	55	4 768 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	45	3 901 m²	NE	NE	2160-1
873	Txv	3	1 733 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	60	1 040 m²	NT	2	2130-4*
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Atropetalia belladonnae J. Vlieger 1937</i>	Friches et végétations rudérales	40	693 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
874	Txv	3	6 436 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	30	1 931 m²	NT	3	2180-1
				Hab. 2	Groupement dunaire à Euphrasia nemorosa et Luzula campestris	Pelouses dunaires	25	1 609 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 3	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Mentho longifoliae - Juncion inflexi T. Müll. & Görs ex de Foucault 2008</i>	Prairies hygroclines à hygrophiles	25	1 609 m²	NT	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 4	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Atropetalia belladonnae J. Vlieger 1937</i>	Friches et végétations rudérales	20	1 287 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
875		3	1 037 m²	Hab. 1	Groupement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	75	778 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	25	259 m²	NE	NE	2130-4*
876		3	1 797 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	1 797 m²	NT	2	2160-1
877		3	24 110 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	24 110 m²	T	1	2120-1
878		3	1 749 m²	Hab. 1	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	75	1 312 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	437 m²	NE	2	2120-1
879		3	761 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	761 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
880		3	3 364 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	3 364 m²	T	2	2160-1
881		3	6 407 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	5 446 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	961 m²	NT	3	2130-1*
882	P52	3	2 980 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	48	1 431 m²	T	1	2160-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
				Hab. 2	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	48	1 431 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 3	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	4	119 m²	NT	2	2190-3
883	P53	3	287 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	287 m²	T	2	2160-1
884	Tvx	3	8 318 m²	U	<i>Déboisement (débroussaillage) Récent (végétation idéterminée en cours de structuration)</i>	Zone de travaux récents	100	8 318 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
885		3	3 393 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	3 393 m²	NE	NE	2190-3
886		3	1 495 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	1 495 m²	NE	NE	2190-3
887	Tvx	3	1 831 m²	Hab. 1	Groupe ment dunaire à Euphrasia nemorosa et Luzula campestris	Pelouses dunaires	80	1 464 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	20	366 m²	NE	NE	2180-1
888		3	1 367 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 367 m²	NE	NE	2180-1
889	Tvx	3	8 371 m²	Hab. 1	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	90	7 534 m²	NT	2	6510-4
				Hab. 2	Groupe ment à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	10	837 m²	NT	3	2130-1*
890		3	564 m²	Hab. 1	Groupe ment à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	75	423 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	25	141 m²	NE	NE	2130-4*
891	P55	3	2 672 m²	Hab. 1	Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	4	107 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 2	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	4	107 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 3	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov</i>	Fourrés dunaires	4	107 m²	T	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 4	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	88	2 351 m²	T	3	2160-1
892		3	523 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	523 m²	T	2	2190-3
893		3	9 601 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	8 161 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	15	1 440 m²	NE	2	2160-1
894		3	3 100 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	2 325 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	775 m²	NT	3	2130-1*
895		3	510 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	510 m²	T	2	2130-1*
896	P54	3	151 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	99	149 m²	T	2	2160-1
				Hab. 2	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	1	2 m²	NT	2	2190-3
897	Tvx	3	2 579 m²	U	<i>Déboisement (débroussaillage) Récent (végétation idéterminée en cours de structuration)</i>	Zone de travaux récents	100	2 579 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
898		3	106 808 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	90 787 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	16 021 m²	NT	3	2130-1*
899	Tvx	3	48 503 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Mentho longifoliae - Juncion inflexi T. Müll. & Görs ex de Foucault 2008</i>	Prairies hygrocines à hygrophiles	95	46 078 m²	T	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	<i>Hydrocotylo vulgaris - Eleocharitetum palustris Julve 1989 nom. ined.</i>	Prairies hygrocines à hygrophiles	5	2 425 m²	NT	<i>NI</i>	<i>NI</i>
900	Tvx	3	9 452 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Mentho longifoliae - Juncion inflexi T. Müll. & Görs ex de Foucault 2008</i>	Prairies hygrocines à hygrophiles	60	5 671 m²	T	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Groupe ment dunaire à Euphrasia nemorosa et Luzula campestris	Pelouses dunaires	40	3 781 m²	T	1	2130-1*
901	Tvx	3	3 236 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Phragmition communis W. Koch 1926	Roselières	70	2 265 m²	NT	2	2190-5
				Hab. 2	Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	28	906 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 3	Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis Schaminée & V. Westh. in Schaminée et al. 1992	Végétations amphibies et de bas-marais	2	65 m²	NT	2	2190-2
902		3	2 331 m²	U	<i>Plan d'eau non végétalisé</i>	Végétations aquatiques - Plans d'eau	100	2 331 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
903	Tvx	3	975 m²	U	Groupe ment dunaire à Eupatorium cannabinum et Calamagrostis epigejos Duhamel 2009	Mégaphorbiaies	100	975 m²	NT	2	2190-5
904	Tvx	3	193 m²	U	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulo arvensis - Agropyron repentis Görs 1966</i>	Friches et végétations rudérales	100	193 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
905		3	1 061 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	75	795 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	25	265 m²	NE	NE	2190-3
906		3	10 675 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	60	6 405 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	40	4 270 m²	NE	NE	2130-4*
907		3	5 908 m²	U	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	5 908 m²	NE	1	2190-3
908		3	5 419 m²	Hab. 1	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	85	4 606 m²	NE	1	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	813 m²	NE	2	2120-1
909		3	538 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	538 m²	T	2	2130-1*
910		3	16 841 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	6 736 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	40	6 736 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	3 368 m²	NE	2	2130-1*
911		3	86 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	86 m²	T	2	2130-1*
912		3	2 104 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	2 104 m²	T	3	2130-1*
913		3	390 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	390 m²	T	2	2130-1*
914	Tvx	3	4 351 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	4 351 m²	NT	2	2130-1*
915	Tvx	3	5 569 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	80	4 456 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	10	557 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 3	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	10	557 m²	NT	2	2160-1
916		3	1 284 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	50	642 m²	NE	2	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	25	321 m²	NE	NE	2120-1
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	25	321 m²	NE	NE	2160-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
917	Tvx	3	1 940 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	70	1 358 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	30	582 m²	NT	2	2160-1
918	P58	3	374 m²	Hab. 1	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	20	75 m²	T	2	2190-3
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	80	299 m²	T	2	2160-1
919	Tvx	3	1 235 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	60	741 m²	NT	2	2130-4*
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Atropetalia belladonnae J. Vlieger 1937</i>	Friches et végétations rudérales	40	494 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
920		3	1 104 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	55	607 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	45	497 m²	NE	NE	2160-1
921	Tvx	3	7 046 m²	Hab. 1	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	90	6 341 m²	T	1	6510-4
				Hab. 2	Groupement dunaire à Lonicera periclymenum et Teucrium scorodonia Duhamel 1994 nom. ined.	Ourlets et Prairies	10	705 m²	T	1	2130-4*
922	Tvx	3	5 659 m²	U	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	5 659 m²	T	1	2190-3
923	Tvx	3	2 002 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulo arvensis - Agropyron repentis Görs 1966</i>	Friches et végétations rudérales	50	1 001 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Groupeement dunaire à Eupatorium cannabinum et Calamagrostis epigejos Duhamel 2009	Mégaphorbiaies	50	1 001 m²	NT	2	2190-5
924	Tvx	3	1 055 m²	U	Groupeement dunaire à Eupatorium cannabinum et Calamagrostis epigejos Duhamel 2009	Mégaphorbiaies	100	1 055 m²	NT	2	2190-5
925		3	333 m²	U	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	100	333 m²	NE	NE	6510-4
926		3	215 m²	U	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	100	215 m²	NE	NE	6510-4
927	Tvx	3	10 780 m²	U	<i>Déboisement (débroussaillage) Récent (végétation idéterminée en cours de structuration)</i>	Zone de travaux récents	100	10 780 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
928		3	8 251 m²	Hab. 1	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	60	4 951 m²	NE	2	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictrio flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	40	3 300 m²	NE	NE	2190-5
929		3	3 792 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	3 792 m²	NE	1	2120-1
930		3	6 069 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	6 069 m²	T	2	2160-1
931		3	32 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	32 m²	T	2	2130-1*
932		3	408 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	408 m²	T	2	2130-1*
933		3	2 546 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	2 164 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	382 m²	NT	3	2130-1*
934		3	2 242 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	2 242 m²	T	3	2130-1*
935	Tvx	3	3 924 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	3 924 m²	T	1	2130-1*
936	Tvx	3	861 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	861 m²	T	1	2160-1
937	Tvx	3	1 050 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	1 050 m²	NT	2	2130-4*
938	Tvx	3	810 m²	U	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis Tüxen 1947</i>	Prairies hygrocines à hygrophiles	100	810 m²	NT	<i>NI</i>	<i>NI</i>
939		3	108 m²	U	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	108 m²	NE	2	2190-3
940		3	119 m²	U	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	119 m²	NE	2	2190-3
941		3	900 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	50	450 m²	NE	2	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	25	225 m²	NE	NE	2120-1
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	25	225 m²	NE	NE	2160-1
942	Tvx	3	650 m²	U	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	650 m²	T	1	2190-3
943		3	1 175 m²	U	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	1 175 m²	NE	2	2190-3
944	Tvx	3	5 632 m²	U	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	5 632 m²	NT	2	2190-3
945		3	517 m²	U	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	100	517 m²	NT	2	2190-2
946		3	390 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	390 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
947		3	587 m²	Hab. 1	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	85	499 m²	NE	1	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	88 m²	NE	2	2120-1
948		3	2 446 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	2 446 m²	T	2	2160-1
949		3	6 775 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	6 775 m²	T	2	2130-1*
950		3	1 498 m²	U	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 498 m²	NE	2	2190-3
951	P57	3	3 147 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	3 147 m²	T	2	2160-1
952		3	2 968 m²	U	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	2 968 m²	NE	2	2190-3
953		3	468 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Phragmition communis W. Koch 1926	Roselières	100	468 m²	NE	NE	2190-5
954	Tvx	3	20 401 m²	Hab. 1	Solano dulcamarae - Phragmitetum australis (Krausch 1965) Succow 1974	Roselières	50	10 201 m²	T	1	2190-5
				Hab. 2	Groupeement à Carex acutiformis et Carex riparia Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009	Mégaphorbiaies	30	6 120 m²	NT	1	2190-5
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictrio flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	18	3 672 m²	NT	2	2190-5
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	2	408 m²	NT	3	2180-1
955	Tvx	3	20 436 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	20 436 m²	NT	2	2180-1
956		3	1 679 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	50	839 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	45	755 m²	NE	NE	6510-4
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	5	84 m²	NE	NE	2180-1
957		3	314 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictrio flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	75	236 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	25	79 m²	NE	NE	2190-3
958		3	746 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictrio flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	75	559 m²	NE	NE	2190-5

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	25	186 m²	NE	NE	2190-3
959		3	1 469 m²	U	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	1 469 m²	NE	2	2190-3
960		3	337 m²	U	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	337 m²	NE	2	2190-3
961	Tvx	3	887 m²	U	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	887 m²	NT	3	2190-3
962	Tvx	3	1 230 m²	U	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	1 230 m²	NT	2	2190-3
963	Tvx	3	3 143 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	40	1 257 m²	NT	2	2190-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	30	943 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 3	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	30	943 m²	NT	NE	6510-4
964		3	888 m²	Hab. 1	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	60	533 m²	NE	2	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	40	355 m²	NE	NE	2190-5
965		3	4 004 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	55	2 202 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	45	1 802 m²	NE	NE	2190-3
966		3	3 257 m²	U	<i>Plan d'eau non végétalisé</i>	Végétations aquatiques - Plans d'eau	100	3 257 m²	NE	NI	NI
967		3	696 m²	U	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	696 m²	NE	1	2190-3
968		3	136 671 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Estran	100	136 671 m²	NE	NI	NI
969		3	6 352 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	60	3 811 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	40	2 541 m²	NE	NI	NI
970		3	5 354 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	5 354 m²	NE	NI	NI
971		3	25 288 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	21 495 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	3 793 m²	NT	3	2130-1*
972		3	436 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	327 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	109 m²	NT	2	2160-1
973	P59	3	2 650 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	53	1 404 m²	T	3	2160-1
				Hab. 2	Groupe ment à Carex acutiformis et Carex riparia Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009	Mégaphorbiaies	30	795 m²	T	3	2190-5
				Hab. 3	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	10	265 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 4	Ophioglosso vulgati - Calamagrostietum epigeji V. Westh. & Segal 1961	Végétations amphibies et de bas-marais	3	79 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 5	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	3	79 m²	T	3	2190-3
				Hab. 6	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov</i>	Fourrés dunaires	1	26 m²	T	NI	NI
974		3	608 m²	U	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	608 m²	NE	1	2190-3
975		3	108 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	108 m²	NE	NE	2130-4*
976	P60	3	6 326 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	94	5 946 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	5	316 m²	T	1	2190-3
				Hab. 3	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	1	63 m²	NT	2	2190-2
977	Tvx	3	2 664 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	2 664 m²	NT	2	2180-1
978		3	1 373 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	75	1 030 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	25	343 m²	NE	NE	2190-3
979	Tvx	3	404 m²	U	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	100	404 m²	NT	2	2190-3
980	Tvx	3	4 228 m²	U	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	100	4 228 m²	T	2	6510-4
981		3	514 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	514 m²	T	1	2180-5
982		3	5 723 m²	Hab. 1	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	60	3 434 m²	NE	2	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	40	2 289 m²	NE	NE	2190-5
983		3	1 461 839 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 461 839 m²	T	1	2180-5
984		3	556 m²	Hab. 1	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	85	473 m²	NE	1	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	83 m²	NE	2	2120-1
985		3	284 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	284 m²	NT	3	2120-1
986		3	230 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	230 m²	T	2	2130-1*
987		3	226 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	226 m²	T	2	2130-1*
988		3	857 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	643 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	214 m²	NT	3	2130-1*
989		3	111 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	75	84 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	28 m²	NT	3	2120-1
990		3	41 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	41 m²	T	2	2130-1*
991		3	474 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	356 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	119 m²	NT	3	2130-1*
992		3	30 472 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	12 189 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	40	12 189 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	6 094 m²	NE	2	2130-1*
993		3	46 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	76	35 m²	NE	1	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	8	4 m²	NE	1	2130-1*

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
994	P62	3	1 112 m²	Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	8	4 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	8	4 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 1	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvern. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	24	267 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Phragmition communis W. Koch 1926	Roselières	24	267 m²	NT	3	2190-5
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulion sepium Tüxen in Oberd. 1957	Mégaphorbiaies	24	267 m²	NT	3	6430-4
				Hab. 4	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	24	267 m²	T	3	2160-1
995		3	1 327 m²	Hab. 5	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov</i>	Fourrés dunaires	4	44 m²	T	NI	NI
				Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictrio flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	85	1 128 m²	NE	NE	2190-5
996		3	5 187 m²	Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	15	199 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	65	3 371 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	15	778 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	778 m²	NE	2	2130-1*
997		3	990 m²	Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	5	259 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	75	742 m²	NE	NE	2190-3
998		3	11 296 m²	Hab. 2	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	25	247 m²	NE	1	2190-3
				Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	55	6 213 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	40	4 519 m²	NE	NE	6510-4
999		3	700 m²	Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	5	565 m²	NE	NE	2190-3
				U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	700 m²	NE	NE	2180-1
1000	Tvx	3	1 140 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	1 140 m²	NT	3	2190-3
1001		3	395 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	50	198 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	45	178 m²	NE	NE	6510-4
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	5	20 m²	NE	NE	2180-1
1002	Tvx	3	2 120 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictrio flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	50	1 060 m²	NT	2	2190-5
				Hab. 2	Groupeement à Carex acutiformis et Carex riparia Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009	Mégaphorbiaies	50	1 060 m²	NE	NE	2190-5
1003	Tvx	3	686 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	686 m²	NT	2	2180-5
1004		3	1 039 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictrio flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	75	779 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis Tüxen 1947</i>	Prairies hygrocines à hygrophiles	25	260 m²	NE	NI	NI
1005		3	683 m²	U	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	100	683 m²	NE	NE	6510-4
1006		3	660 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	660 m²	NE	NE	2190-3
1007		3	277 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	277 m²	NE	NI	NI
1008		3	14 646 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	10 985 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	25	3 662 m²	NE	1	2120-1
1009		3	1 841 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	65	1 197 m²	T	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	644 m²	NE	NI	NI
1010		3	275 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	275 m²	NT	3	2120-1
1011		3	130 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	130 m²	T	2	2130-1*
1012		3	189 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	189 m²	T	2	2130-1*
1013		3	224 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	224 m²	T	2	2130-1*
1014		3	12 763 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	10 849 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	1 915 m²	NT	3	2130-1*
1015		3	599 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	449 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	150 m²	NT	2	2160-1
1016	Tvx	3	2 159 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	90	1 943 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	10	216 m²	NT	NE	2160-1
1017		3	318 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	239 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	80 m²	NT	2	2160-1
1018	Tvx	3	5 884 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	5 884 m²	T	1	2130-1*
1019		3	282 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	76	214 m²	NE	1	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	8	23 m²	NE	1	2130-1*
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	8	23 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	8	23 m²	NE	NE	2190-3
1020	Tvx	3	945 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	70	662 m²	NT	1	2130-4*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	20	189 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 3	<i>Communauté dunaire à Carex flacca et Euphrasia nemorosa</i>	Prairies hygrocines à hygrophiles	10	95 m²	NT	NE	6510-?
1021		3	846 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	55	465 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	40	338 m²	NE	NE	6510-4
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	5	42 m²	NE	NE	2190-3
1022		3	2 315 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	50	1 158 m²	NE	NE	2190-3

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
				Hab. 2	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	45	1 042 m²	NE	NE	6510-4
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	5	116 m²	NE	NE	2180-1
1023		3	1 809 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictrio flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	75	1 357 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	25	452 m²	NE	NE	2190-3
1024	Tvx	3	4 470 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	80	3 576 m²	T	1	2130-4*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	15	670 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 3	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	4	179 m²	NT	NE	6510-4
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thero-Airion Tüxen ex Oberd. 1957	Pelouses dunaires	1	45 m²	T	2	2130-5*
1025		3	562 m²	Hab. 1	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	85	478 m²	NE	1	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	84 m²	NE	2	2120-1
1026		3	49 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	49 m²	T	2	2130-1*
1027		3	149 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	149 m²	T	2	2130-1*
1028		3	141 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	141 m²	T	2	2130-1*
1029		3	359 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	359 m²	T	2	2130-1*
1030		3	177 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	177 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1031		3	1 229 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	75	922 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	307 m²	NT	3	2120-1
1032		3	5 163 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	3 872 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	1 291 m²	NT	3	2130-1*
1033		3	580 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	435 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	145 m²	NT	2	2160-1
1034		3	242 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	181 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	60 m²	NT	2	2160-1
1035		3	436 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	327 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	109 m²	NT	2	2160-1
1036	Tvx	3	511 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	50	255 m²	NT	2	2130-4*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	204 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	10	51 m²	NT	2	2130-1*
1037	Tvx	3	4 888 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	50	2 444 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	<i>Communauté dunaire à Carex flacca et Euphrasia nemorosa</i>	Prairies hygrocines à hygrophiles	30	1 466 m²	NT	2	6510-?
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	15	733 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	5	244 m²	NT	2	2130-1*
1038	Tvx	3	5 492 m²	Hab. 1	<i>Communauté dunaire à Carex flacca et Euphrasia nemorosa</i>	Prairies hygrocines à hygrophiles	60	3 295 m²	T	NE	6510-?
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	30	1 648 m²	T	1	2130-1*
				Hab. 3	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	8	439 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 4	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	2	110 m²	NE	NE	2160-1
1039	Tvx	3	316 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	316 m²	T	1	2160-1
1040		3	28 235 m²	Hab. 1	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	30	8 470 m²	NE	NE	6510-4
				Hab. 2	Groupe ment à Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus et Tetragonolobus maritimus Duhamel 1995 / Alliance à préciser	Ourlets et Prairies	30	8 470 m²	NE	NE	6410-14
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	30	8 470 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	10	2 823 m²	NE	NE	2190-3
1041		3	2 250 m²	Hab. 1	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	55	1 237 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	45	1 012 m²	NE	3	2120-1
1042		3	3 130 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	469 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	85	2 660 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1043		3	3 471 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	100	3 471 m²	NE	2	2160-1
1044		3	630 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	630 m²	T	2	2130-1*
1045		3	27 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	76	20 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	8	2 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	8	2 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	8	2 m²	NE	NE	2190-3
1046		3	1 967 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	76	1 495 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	8	157 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	8	157 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	8	157 m²	NE	NE	2190-3
1047		3	90 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	90 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1048		3	179 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	179 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1049		3	196 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	196 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1050		3	892 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	892 m²	NT	3	2120-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
1051		3	765 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	574 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	191 m²	NT	2	2160-1
1052		3	1 284 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	963 m²	T	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	321 m²	NT	2	2160-1
1053	Txv	3	973 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	80	779 m²	NT	1	2130-4*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	10	97 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	10	97 m²	NT	2	2160-1
1054		3	1 265 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 265 m²	NE	NE	2180-1
1055		3	234 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	234 m²	NE	NE	2190-3
1056		3	1 573 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 573 m²	NE	NE	2180-1
1057		3	383 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	383 m²	NE	NE	2180-1
1058		3	2 645 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	2 645 m²	T	1	2180-5
1059		3	4 976 m²	Hab. 1	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	65	3 234 m²	NE	2	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	35	1 741 m²	NE	NE	2190-5
1060		3	1 346 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	65	875 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	471 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1061		3	3 962 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	594 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	85	3 368 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1062		3	151 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	100	151 m²	NE	2	2160-1
1063		3	11 532 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	8 649 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	2 883 m²	NT	3	2130-1*
1064		3	803 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	803 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1065		3	2 890 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	75	2 167 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	722 m²	NT	3	2120-1
1066		3	2 270 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	2 270 m²	NT	3	2120-1
1067		3	286 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	286 m²	T	1	2160-1
1068	P65	3	1 060 m²	Hab. 1	Groupeement à Carex acutiformis et Carex riparia Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009	Mégaphorbiaies	72	764 m²	T	2	2190-5
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	22	233 m²	T	2	2160-1
				Hab. 3	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	3	32 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 4	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	3	32 m²	T	2	2190-3
1069		3	52 m²	Hab. 1	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	55	29 m²	NE	2	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	45	24 m²	NE	NE	2190-3
1070		3	947 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	40	379 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	40	379 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 3	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	15	142 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 4	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	5	47 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1071		3	473 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	473 m²	T	1	2160-1
1072		3	265 m²	Hab. 1	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	55	146 m²	NE	2	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	45	119 m²	NE	NE	2190-3
1073		3	1 604 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 604 m²	NE	NE	2180-1
1074		3	2 121 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	2 121 m²	NE	NE	2190-3
1075		3	533 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	533 m²	NE	NE	2180-1
1076		3	1 282 m²	U	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	1 282 m²	NE	2	2190-3
1077		3	19 340 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulo arvensis - Agropyron repentis Görs 1966</i>	Friches et végétations rudérales	50	9 670 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	25	4 835 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 3	Groupeement à Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus et Tetragonolobus maritimus Duhamel 1995 / Alliance à préciser	Ourllets et Prairies	25	4 835 m²	NE	NE	6410-14
1078		3	7 061 m²	U	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	7 061 m²	NE	2	2190-3
1079		3	8 861 m²	U	Colchico autumnnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	100	8 861 m²	NE	NE	6510-4
1080		3	7 815 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	7 815 m²	T	2	2120-1
1081		3	3 037 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	455 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	85	2 581 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1082		3	5 396 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	4 587 m²	T	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	15	809 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1083		3	66 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	100	66 m²	NE	NE	2130-1*
1084		3	223 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	189 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	33 m²	NT	3	2130-1*
1085	P66	3	5 024 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	40	2 009 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	40	2 009 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 3	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	14	703 m²	T	1	2190-3

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulion sepium Tüxen in Oberd. 1957	Mégaphorbiaies	3	151 m²	NT	2	6430-4
				Hab. 5	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov</i>	Fourrés dunaires	1	50 m²	T	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 6	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	1	50 m²	NT	2	2190-2
				Hab. 7	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	1	50 m²	NT	2	2190-3
1086		3	282 m²	Hab. 1	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	55	155 m²	NE	2	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	45	127 m²	NE	NE	2190-3
1087		3	269 m²	Hab. 1	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	55	148 m²	NE	2	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	45	121 m²	NE	NE	2190-3
1088		3	2 345 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	2 345 m²	T	1	2160-1
1089		3	75 225 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	63 941 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	11 284 m²	NT	3	2130-1*
1090		3	3 617 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	3 617 m²	NT	3	2130-1*
1091		3	1 654 m²	Hab. 1	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	55	910 m²	NE	NE	6510-4
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	45	744 m²	NE	NE	2130-4*
1092		3	138 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Charetalia hispidae F. Sauer ex Krausch 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	75	103 m²	NE	NE	2190-1
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Oenanthion fistulosae de Foucault 2008</i>	Prairies hygroclines à hygrophiles	10	14 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ranunculion aquatilis H. Passarge 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	10	14 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	5	7 m²	NE	NE	2190-3
1093		3	27 139 m²	Hab. 1	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	50	13 569 m²	NE	NE	6510-4
				Hab. 2	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	25	6 785 m²	NE	2	2190-3
				Hab. 3	Groupeement à Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus et Tetragonolobus maritimus Duhamel 1995 / Alliance à préciser	Ourllets et Prairies	25	6 785 m²	NE	NE	6410-14
1094		3	32 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Charetalia hispidae F. Sauer ex Krausch 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	75	24 m²	NE	NE	2190-1
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Oenanthion fistulosae de Foucault 2008</i>	Prairies hygroclines à hygrophiles	10	3 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ranunculion aquatilis H. Passarge 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	10	3 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	5	2 m²	NE	NE	2190-3
1095		3	210 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	210 m²	T	1	2180-5
1096		3	5 522 m²	U	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	100	5 522 m²	NE	NE	6510-4
1097		3	4 104 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	4 104 m²	NE	NE	2180-1
1098		3	9 432 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	9 432 m²	NE	NE	2180-1
1099		3	460 m²	U	Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis Schaminée & V. Westh. in Schaminée et al. 1992	Végétations amphibies et de bas-marais	100	460 m²	NE	NE	2190-2
1100		3	1 353 m²	Hab. 1	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	85	1 150 m²	T	1	2190-2
				Hab. 2	Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis Schaminée & V. Westh. in Schaminée et al. 1992	Végétations amphibies et de bas-marais	15	203 m²	NE	NE	2190-2
1101		3	5 085 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	5 085 m²	NE	NE	2180-1
1102		3	1 532 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	85	1 302 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	15	230 m²	NE	NE	2190-5
1103		3	1 401 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	771 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 2	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	45	630 m²	NE	2	2160-1
1104		3	1 990 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	100	1 990 m²	NT	NE	2160-1
1105		3	1 177 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	647 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	530 m²	NE	2	2160-1
1106		3	1 202 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 202 m²	NE	NE	2180-1
1107		3	660 m²	U	<i>Non prospecté</i>	Milieux anthropisés	100	660 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1108	Txv	3	4 883 m²	Hab. 1	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	80	3 906 m²	T	1	2190-3
				Hab. 2	Communauté à Lotus pedunculatus et Anthoxanthum odoratum	Prairies hygroclines à hygrophiles	20	977 m²	T	1	6410-14
1109		3	3 677 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	3 677 m²	NE	NE	2180-1
1110		3	731 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	100	731 m²	NE	NE	2190-5
1111		3	5 971 m²	U	<i>Plan d'eau non végétalisé</i>	Végétations aquatiques - Plans d'eau	100	5 971 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1112		3	1 035 m²	U	Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis Schaminée & V. Westh. in Schaminée et al. 1992	Végétations amphibies et de bas-marais	100	1 035 m²	NE	NE	2190-2
1113		3	547 m²	U	Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis Schaminée & V. Westh. in Schaminée et al. 1992	Végétations amphibies et de bas-marais	100	547 m²	NE	NE	2190-2
1114		3	559 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Charetalia hispidae F. Sauer ex Krausch 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	100	559 m²	NE	NE	2190-1
1115		3	872 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	65	567 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	35	305 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1116		3	20 944 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	35	7 330 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	65	13 613 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1117		3	793 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	793 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1118		3	1 991 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	1 692 m²	T	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	15	299 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1119		3	168 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	168 m²	NT	3	2130-1*
1120		3	3 459 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	3 459 m²	NT	3	2130-1*

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
1121		3	23 515 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	23 515 m²	T	1	2160-1
1122		3	222 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	65	144 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	35	78 m²	NE	NE	2190-3
1123		3	3 267 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	2 777 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	490 m²	NT	3	2130-1*
1124		3	1 225 m²	U	<i>Non prospecté</i>	Milieux anthropisés	100	1 225 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1125	Tvx	3	775 m²	U	Groupeement dunaire à Eupatorium cannabinum et Calamagrostis epigejos Duhamel 2009	Mégaphorbiaies	100	775 m²	NT	2	2190-5
1126	Tvx	3	4 810 m²	Hab. 1	<i>Communauté à Holcus lanatus et Anthoxanthum odoratum</i>	Prairies hygrocines à hygrophiles	90	4 329 m²	T	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Communauté à Lotus pedunculatus et Anthoxanthum odoratum	Prairies hygrocines à hygrophiles	10	481 m²	NT	2	6410-14
1127		3	23 697 m²	U	<i>Zone anthropisée</i>	Milieux anthropisés	100	23 697 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1128	Tvx	3	3 546 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	90	3 191 m²	NT	2	2190-5
				Hab. 2	Solano dulcamarae - Phragmitetum australis (Krausch 1965) Succow 1974	Roselières	10	355 m²	NE	NE	2190-5
1129	Tvx	3	14 172 m²	U	<i>Déboisement (débroussaillage) Récent (végétation idétérminée en cours de structuration)</i>	Zone de travaux récents	100	14 172 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1130		3	2 661 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	100	2 661 m²	NT	NE	2160-1
1131		3	223 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	100	223 m²	NE	NE	2130-1*
1132		3	1 184 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	888 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	296 m²	NT	3	2130-1*
1133		3	281 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	281 m²	NT	3	2130-1*
1134		3	1 328 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	1 328 m²	NT	3	2130-1*
1135		3	2 136 m²	Hab. 1	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	55	1 175 m²	NE	NE	6510-4
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	45	961 m²	NE	NE	2130-4*
1136	Tvx	3	1 846 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	90	1 661 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 2	Communauté à Lotus pedunculatus et Anthoxanthum odoratum	Prairies hygrocines à hygrophiles	10	185 m²	NT	2	6410-14
1137		3	1 103 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 103 m²	NE	NE	2180-1
1138	Tvx	3	10 844 m²	Hab. 1	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	95	10 302 m²	NT	1	2190-3
				Hab. 2	Communauté à Lotus pedunculatus et Anthoxanthum odoratum	Prairies hygrocines à hygrophiles	5	542 m²	NT	1	6410-14
1139		3	434 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	100	434 m²	NE	NE	2190-5
1140		3	2 757 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	100	2 757 m²	NE	NE	2190-5
1141		3	145 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Oenanthion aquaticae Hejny ex Neuhäusl 1959	Mégaphorbiaies	50	72 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Lemnetalia minoris O. Bolòs & Masclans 1955	Végétations aquatiques - Plans d'eau	25	36 m²	NE	NE	3150-4
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ranunculion aquatilis H. Passarge 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	25	36 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1142		3	328 m²	U	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	100	328 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1143		3	97 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	97 m²	NT	3	2130-1*
1144		3	9 673 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	9 673 m²	T	2	2120-1
1145		3	324 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	324 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1146		3	798 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	798 m²	NT	3	2120-1
1147		3	327 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	327 m²	NT	3	2130-1*
1148		3	2 699 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	2 699 m²	T	1	2160-1
1149		3	696 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	100	696 m²	NE	NE	2130-4*
1150	Tvx	3	1 914 m²	Hab. 1	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	98	1 876 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	2	38 m²	NE	1	2180-1
1151		3	718 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	100	718 m²	NE	NE	2130-4*
1152		3	16 806 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulo arvensis - Agropyron repentis Görs 1966</i>	Friches et végétations rudérales	50	8 403 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	25	4 202 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 3	Groupeement à Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus et Tetragonolobus maritimus Duhamel 1995 / Alliance à préciser	Ourllets et Prairies	25	4 202 m²	NE	NE	6410-14
1153	Tvx	3	5 635 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	70	3 944 m²	NT	2	2190-5
				Hab. 2	Solano dulcamarae - Phragmitetum australis (Krausch 1965) Succow 1974	Roselières	30	1 690 m²	T	1	2190-5
1154	Tvx	3	18 793 m²	Hab. 1	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	95	17 854 m²	T	2	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	5	940 m²	NE	NE	2180-1
1155	Tvx	3	243 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Charetalia hispidae F. Sauer ex Krausch 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	100	243 m²	NE	NE	2190-1
1156	Tvx	3	10 081 m²	U	<i>Déboisement (débroussaillage) Récent (végétation idétérminée en cours de structuration)</i>	Zone de travaux récents	100	10 081 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1157		3	1 351 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	1 351 m²	NE	NE	2190-3
1158	Tvx	3	1 161 m²	Hab. 1	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	50	581 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	50	581 m²	NT	2	2180-1
1159		3	578 m²	U	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	578 m²	NE	2	2190-3
1160		3	1 063 m²	U	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	100	1 063 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1161		3	99 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	99 m²	NT	3	2130-1*
1162		3	6 751 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	100	6 751 m²	NT	NE	2160-1
1163		3	391 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	391 m²	NT	3	2130-1*

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
1164		3	156 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	156 m²	NT	3	2130-1*
1165		3	376 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	376 m²	NT	3	2130-1*
1166		3	8 928 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	8 928 m²	T	1	2160-1
1167		3	2 103 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	2 103 m²	NE	3	2130-1*
1168		3	540 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	540 m²	NT	3	2130-1*
1169		3	3 420 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	3 420 m²	NE	NE	2180-1
1170		3	13 863 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	13 863 m²	NE	NE	2180-1
1171		3	581 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Charetalia hispidae F. Sauer ex Krausch 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	75	436 m²	NE	NE	2190-1
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Oenanthion fistulosae de Foucault 2008</i>	Prairies hygroclines à hygrophiles	10	58 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ranunculion aquatilis H. Passarge 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	10	58 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	5	29 m²	NE	NE	2190-3
1172		3	13 323 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	13 323 m²	NE	NE	2180-1
1173	Tvx	3	60 581 m²	Hab. 1	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	85	51 494 m²	T	1	2190-3
				Hab. 2	Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	10	6 058 m²	T	1	2190-3
				Hab. 3	Communauté à Lotus pedunculatus et Anthoxanthum odoratum	Prairies hygroclines à hygrophiles	5	3 029 m²	T	1	6410-14
1174	Tvx	3	5 871 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	5 871 m²	NT	2	2190-3
1175	Tvx	3	7 456 m²	U	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	7 456 m²	NT	1	2190-3
1176		3	1 504 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 504 m²	NE	NE	2180-1
1177	Tvx	3	4 138 m²	Hab. 1	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	90	3 724 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	10	414 m²	NE	NE	2180-1
1178		3	436 m²	U	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	436 m²	NE	2	2190-3
1179		3	120 m²	U	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	120 m²	NE	1	2190-3
1180		3	578 m²	U	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	100	578 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1181		3	478 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	478 m²	NT	3	2130-1*
1182		3	117 m²	U	Beto maritimae - Atriplicetum laciniatae Tüxen (1950) 1967	Dune bordière	100	117 m²	NT	2	1210-1
1183		3	2 219 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	2 219 m²	T	2	2120-1
1184		3	1 579 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	35	553 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	65	1 026 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1185		3	5 714 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	3 143 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	45	2 571 m²	NE	2	2160-1
1186		3	290 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	290 m²	NT	2	2160-1
1187		3	1 041 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	1 041 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1188		3	453 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	453 m²	NT	3	2120-1
1189		3	864 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	864 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1190		3	10 454 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	7 841 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	2 614 m²	NT	3	2130-1*
1191		3	13 955 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	11 861 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	2 093 m²	NT	3	2130-1*
1192		3	6 633 m²	Hab. 1	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	55	3 648 m²	NE	NE	6510-4
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	45	2 985 m²	NE	NE	2130-4*
1193	Tvx	3	9 631 m²	U	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	9 631 m²	T	1	2190-3
1194		3	680 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	100	680 m²	NE	NE	2190-5
1195		3	1 451 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulo arvensis - Agropyron repentis Görs 1966</i>	Friches et végétations rudérales	50	725 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	25	363 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 3	Groupeement à Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus et Tetragonolobus maritimus Duhamel 1995 / Alliance à préciser	Ourlets et Prairies	25	363 m²	NE	NE	6410-14
1196		3	166 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	166 m²	NE	NE	2180-1
1197	Tvx	3	2 801 m²	U	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	2 801 m²	NT	2	2190-3
1198		3	777 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	777 m²	NT	3	2130-1*
1199		3	2 373 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	65	1 543 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	831 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1200		3	9 863 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	35	3 452 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	65	6 411 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1201		3	110 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	110 m²	NT	2	2160-1
1202		3	106 787 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	80 090 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	21 357 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	<i>Claytonio perfoliatae - Anthriscetum caucalidis Izco, Géhu et Delelis 1978</i>	Ourlets et Prairies	5	5 339 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1203	P68	3	2 018 m²	Hab. 1	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	53	1 069 m²	T	3	2160-1
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov</i>	Fourrés dunaires	28	565 m²	T	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	15	303 m²	T	3	2180-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
				Hab. 4	Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	3	61 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 5	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	1	20 m²	NT	3	2190-3
1204		3	315 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	315 m²	NT	3	2120-1
1205		3	409 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	409 m²	NT	2	2160-1
1206		3	13 864 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	40	5 546 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	40	5 546 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 3	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	15	2 080 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 4	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	5	693 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1207		3	435 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	435 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1208		3	2 885 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	2 164 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	577 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 3	<i>Claytonio perfoliatae - Anthriscetum caucalidis Izco, Géhu et Delelis 1978</i>	Ourllets et Prairies	5	144 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1209		3	2 216 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	2 216 m²	NT	3	2130-1*
1210		3	4 650 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	4 650 m²	NE	NE	2180-1
1211	Tvx	3	8 973 m²	U	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	100	8 973 m²	T	1	2190-3
1212	Tvx	3	3 417 m²	U	Solano dulcamarae - Phragmitetum australis (Krausch 1965) Succow 1974	Roselières	100	3 417 m²	T	1	2190-5
1213	Tvx	3	2 171 m²	U	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	100	2 171 m²	NT	2	6510-4
1214	Tvx	3	10 948 m²	Hab. 1	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	60	6 569 m²	T	1	2190-3
				Hab. 2	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	40	4 379 m²	NT	2	6510-4
1215		3	774 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	774 m²	NT	2	2130-1*
1216		3	1 737 m²	U	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	100	1 737 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1217		3	4 571 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	4 571 m²	T	2	2120-1
1218		3	4 159 m²	Hab. 1	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	55	2 288 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	45	1 872 m²	NE	2	2120-1
1219		3	6 751 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	55	3 713 m²	NE	NE	2180-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978 - faciès à Tremble	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	45	3 038 m²	NE	2	2180-5
1220	P69	3	4 713 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov</i>	Fourrés dunaires	45	2 121 m²	T	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Phragmition communis W. Koch 1926	Roselières	20	943 m²	NT	2	2190-5
				Hab. 3	Groupement à Potamogeton gramineus et characées Duhamel 1995 nom. ined.	Végétations aquatiques - Plans d'eau	20	943 m²	T	1	2190-1
				Hab. 4	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	6	283 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 5	Voile infra-aquatique à Lemna trisulca et Ricciacées	Végétations aquatiques - Plans d'eau	5	236 m²	NT	2	3150-4
				Hab. 6	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulion sepium Tüxen in Oberd. 1957	Mégaphorbiaies	3	141 m²	NT	2	6430-4
				Hab. 7	<i>Prairies flottantes à Glycéries du Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti</i>	Végétations aquatiques - Plans d'eau	1	47 m²	NT	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1221		3	158 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	55	87 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	45	71 m²	NT	2	2160-1
1222		3	401 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	401 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1223		3	2 393 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	2 393 m²	NT	3	2120-1
1224		3	76 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	76 m²	NT	3	2130-1*
1225		3	770 m²	U	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	770 m²	NE	3	2190-3
1226	P67	3	533 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	533 m²	T	3	2160-1
1227		3	139 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	139 m²	NT	3	2130-1*
1228		3	626 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	626 m²	NT	3	2130-1*
1229	Tvx	3	1 032 m²	U	Cladietum marisci Allorge 1922	Roselières	100	1 032 m²	T	1	2190-5
1230	Tvx	3	2 169 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	2 169 m²	NT	2	2190-3
1231		3	9 928 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	9 928 m²	T	1	2180-5
1232		3	1 568 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 568 m²	NE	NE	2180-1
1233	Tvx	3	1 068 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Phragmition communis W. Koch 1926	Roselières	100	1 068 m²	NT	2	2190-5
1234	Tvx	3	5 171 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	80	4 136 m²	NT	2	2130-4*
				Hab. 2	Groupement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	20	1 034 m²	NT	2	2130-1*
1235		3	14 167 m²	U	<i>Non prospecté</i>	Milieux anthropisés	100	14 167 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1236		3	1 685 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 685 m²	NT	3	2120-1
1237		3	8 307 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	100	8 307 m²	NT	NE	2160-1
1238		3	40 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	40 m²	NT	2	2120-1
1239		3	376 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	376 m²	NT	3	2130-1*
1240		3	350 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	350 m²	NT	3	2130-1*
1241		3	1 499 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	1 499 m²	NT	3	2130-1*
1242		3	3 297 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	2 803 m²	NE	1	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	495 m²	NT	3	2130-1*
1243		3	395 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	395 m²	NE	NE	2180-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
1244	Tvx	3	5 534 m²	U	<i>Déboisement (débroussaillage) Récent (végétation indéterminée en cours de structuration)</i>	Zone de travaux récents	100	5 534 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1245	Tvx	3	8 418 m²	Hab. 1	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	98	8 250 m²	NT	2	6510-4
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Atropetalia belladonnae J. Vlieger 1937</i>	Friches et végétations rudérales	2	168 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1246	Tvx	3	9 991 m²	Hab. 1	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	90	8 992 m²	T	1	6510-4
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	10	999 m²	NT	1	2190-3
1247	Tvx	3	6 224 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Charetalia hispidae F. Sauer ex Krausch 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	100	6 224 m²	NT	1	2190-1
1248	Tvx	3	2 184 m²	Hab. 1	Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	80	1 747 m²	T	1	2190-3
				Hab. 2	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	20	437 m²	NT	2	2190-2
1249	Tvx	3	7 420 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	50	3 710 m²	NT	2	2130-4*
				Hab. 2	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	40	2 968 m²	NT	2	6510-4
				Hab. 3	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulo arvensis - Agropyron repentis Görs 1966</i>	Friches et végétations rudérales	10	742 m²	NT	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1250	Tvx	3	7 651 m²	Hab. 1	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	40	3 060 m²	NT	2	6510-4
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	30	2 295 m²	NT	2	2130-4*
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	28	2 142 m²	T	1	2190-3
				Hab. 4	Samolo valerandi - Eleocharitetum quinqueflorae Julve 1992 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	2	153 m²	NT	1	2190-3
1251		3	439 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	439 m²	NT	3	2130-1*
1252		3	5 481 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	35	1 918 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	65	3 563 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1253		3	5 525 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	5 525 m²	T	1	2120-1
1254		3	5 349 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	5 349 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1255		3	2 872 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	2 872 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1256		3	227 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	60	136 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	30	68 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	10	23 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1257		3	2 645 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	2 645 m²	NT	2	2120-1
1258		3	1 404 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	55	772 m²	NE	2	2130-1*
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	632 m²	NE	2	2160-1
1259		3	555 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	85	471 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Phragmition communis W. Koch 1926	Roselières	15	83 m²	NE	NE	2190-5
1260		3	620 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	100	620 m²	NE	NE	2130-4*
1261		3	2 544 m²	U	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	100	2 544 m²	NE	NE	6510-4
1262		3	350 m²	U	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	100	350 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1263		3	523 m²	U	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	100	523 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1264		3	155 m²	U	<i>Zone anthropisée</i>	Milieux anthropisés	100	155 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1265	Tvx	3	495 m²	U	<i>Déboisement (débroussaillage) Récent (végétation indéterminée en cours de structuration)</i>	Zone de travaux récents	100	495 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1266	Tvx	3	5 613 m²	U	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	100	5 613 m²	T	1	6510-4
1267	Tvx	3	1 065 m²	Hab. 1	<i>Communauté à Holcus lanatus et Anthoxanthum odoratum</i>	Prairies hygroclines à hygrophiles	90	959 m²	NT	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Samolo valerandi - Eleocharitetum quinqueflorae Julve 1992 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	10	107 m²	NT	1	2190-3
1268	Tvx	3	1 413 m²	Hab. 1	Rumici obtusifolii - Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	90	1 271 m²	NT	2	6510-7
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Artemisietalia vulgaris Tüxen 1947 nom. nud.</i>	Friches et végétations rudérales	10	141 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1269	Tvx	3	916 m²	U	<i>Déboisement (débroussaillage) Récent (végétation indéterminée en cours de structuration)</i>	Zone de travaux récents	100	916 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1270	Tvx	3	3 878 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	80	3 102 m²	NT	2	2180-1
				Hab. 2	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	10	388 m²	NT	2	6510-4
				Hab. 3	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Atropetalia belladonnae J. Vlieger 1937</i>	Friches et végétations rudérales	10	388 m²	NT	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1271	Tvx	3	11 159 m²	U	<i>Déboisement (débroussaillage) Récent (végétation indéterminée en cours de structuration)</i>	Zone de travaux récents	100	11 159 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1272	Tvx	3	311 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Phragmition communis W. Koch 1926	Roselières	100	311 m²	NT	2	2190-5
1273	Tvx	3	11 898 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	59	7 020 m²	NT	2	2130-4*
				Hab. 2	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	30	3 570 m²	NT	2	6510-4
				Hab. 3	Groupeement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	10	1 190 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	1	119 m²	NT	2	2190-3
1274		3	2 629 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	2 629 m²	NT	3	2120-1
1275		3	921 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	921 m²	T	2	2120-1
1276		3	1 947 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 947 m²	NT	2	2120-1
1277		3	1 770 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	60	1 062 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	30	531 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	10	177 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1278		3	935 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	70	655 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	187 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 3	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	10	94 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
1279		3	787 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Thalictro flavi</i> - <i>Filipendulion ulmariae</i> de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	85	669 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Phragmition communis</i> W. Koch 1926	Roselières	15	118 m²	NE	NE	2190-5
1280		3	6 529 m²	U	<i>Colchico autumnalis</i> - <i>Arrhenatherenion elatioris</i> de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	100	6 529 m²	NE	NE	6510-4
1281		3	1 352 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae</i> Tüxen 1952	Fourrés dunaires	75	1 014 m²	NE	NI	NI
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	25	338 m²	NE	NE	2130-4*
1282	Tvx	3	2 628 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Atropetalia belladonnae</i> J. Vlieger 1937	Friches et végétations rudérales	70	1 840 m²	NE	NI	NI
				Hab. 2	<i>Rumici obtusifolii</i> - <i>Arrhenatherenion elatioris</i> de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	30	788 m²	NT	2	6510-7
1283	Tvx	3	185 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Phragmition communis</i> W. Koch 1926	Roselières	100	185 m²	NT	2	2190-5
1284	Tvx	3	7 931 m²	U	<i>Non prospecté</i>	Milieux anthropisés	100	7 931 m²	NE	NI	NI
1285		3	1 930 m²	U	<i>Non prospecté</i>	Milieux anthropisés	100	1 930 m²	NE	NI	NI
1286		3	919 m²	U	<i>Ligustro vulgaris</i> - <i>Hippophaetum rhamnoidis</i> Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	919 m²	T	1	2160-1
1287		3	564 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	564 m²	NT	3	2130-1*
1288		3	900 m²	Hab. 1	<i>Euphorbio paraliae</i> - <i>Agropyretum junceiformis</i> R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952 corr. Darimont, Duv. & Lamb. 1962	Dune bordière	65	585 m²	NT	3	2110-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	315 m²	NE	NI	NI
1289		3	4 004 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l' <i>Ammophilenion arenariae</i> Géhu 1988	Dune bordière	15	601 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	85	3 404 m²	NE	NI	NI
1290		3	761 m²	U	<i>Euphorbio paraliae</i> - <i>Ammophiletum arenariae</i> R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	761 m²	T	2	2120-1
1291		3	656 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	394 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	<i>Euphorbio paraliae</i> - <i>Ammophiletum arenariae</i> R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	35	230 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 3	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	5	33 m²	NE	NI	NI
1292		3	1 957 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	60	1 174 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	<i>Euphorbio paraliae</i> - <i>Ammophiletum arenariae</i> R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	35	685 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 3	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	5	98 m²	NE	NI	NI
1293		3	642 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Phragmition communis</i> W. Koch 1926	Roselières	75	482 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 2	<i>Samolo valerandi</i> - <i>Baldellion ranunculoidis</i> Schaminée & V. Westh. in Schaminée et al. 1992	Végétations amphibies et de bas-marais	25	161 m²	NE	NE	2190-2
1294		3	612 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Thalictro flavi</i> - <i>Filipendulion ulmariae</i> de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	85	520 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Phragmition communis</i> W. Koch 1926	Roselières	15	92 m²	NE	NE	2190-5
1295		3	308 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Caricenion pulchello-trinervis</i> Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	308 m²	NE	NE	2190-3
1296		3	858 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Caricenion pulchello-trinervis</i> Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	55	472 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis</i> Tüxen 1947	Prairies hygrocines à hygrophiles	45	386 m²	NE	NI	NI
1297		3	6 057 m²	U	<i>Colchico autumnalis</i> - <i>Arrhenatherenion elatioris</i> de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	100	6 057 m²	NE	NE	6510-4
1298		3	396 m²	U	Groupement dunaire à <i>Carex arenaria</i> et <i>Betula pendula</i> Duhamel 2009	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	396 m²	NT	2	2180-1
1299		3	1 204 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae</i> Tüxen 1952	Fourrés dunaires	75	903 m²	NE	NI	NI
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	25	301 m²	NE	NE	2130-4*
1300		3	10 387 m²	U	<i>Ligustro vulgaris</i> - <i>Betuletum pubescentis</i> Géhu & Watez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	10 387 m²	T	1	2180-5
1301	Tvx	3	3 633 m²	U	<i>Solano dulcamarae</i> - <i>Phragmitetum australis</i> (Krausch 1965) Succow 1974	Roselières	100	3 633 m²	T	1	2190-5
1302	Tvx	3	1 239 m²	U	<i>Plan d'eau non végétalisé</i>	Végétations aquatiques - Plans d'eau	100	1 239 m²	NE	NI	NI
1303		3	1 687 m²	Hab. 1	<i>Euphorbio paraliae</i> - <i>Ammophiletum arenariae</i> R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	253 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	85	1 434 m²	NE	NI	NI
1304		3	31 253 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Ligustro vulgaris</i> - <i>Hippophaion rhamnoidis</i> Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	100	31 253 m²	NT	NE	2160-1
1305		3	2 213 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	2 213 m²	NE	NI	NI
1306		3	5 008 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Phragmition communis</i> W. Koch 1926	Roselières	65	3 255 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 2	<i>Samolo valerandi</i> - <i>Littorelletum uniflorae</i> V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	35	1 753 m²	NE	2	2190-2
1307		3	2 921 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Phragmition communis</i> W. Koch 1926	Roselières	75	2 191 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 2	<i>Samolo valerandi</i> - <i>Baldellion ranunculoidis</i> Schaminée & V. Westh. in Schaminée et al. 1992	Végétations amphibies et de bas-marais	25	730 m²	NE	NE	2190-2
1308		3	1 127 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Thalictro flavi</i> - <i>Filipendulion ulmariae</i> de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	85	958 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Phragmition communis</i> W. Koch 1926	Roselières	15	169 m²	NE	NE	2190-5
1309		3	528 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Salicion cinereae</i> T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	528 m²	NE	NE	2180-1
1310		3	11 550 m²	U	<i>Culture à gibier</i>	Milieux anthropisés	100	11 550 m²	NE	NI	NI
1311	Tvx	3	1 559 m²	Hab. 1	<i>Calamagrostio epigeji</i> - <i>Juncetum subnodulosi</i> J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	50	780 m²	NT	3	2190-3
				Hab. 2	<i>Colchico autumnalis</i> - <i>Arrhenatherenion elatioris</i> de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	40	624 m²	NT	2	6510-4
				Hab. 3	<i>Prunello vulgaris</i> - <i>Ranunculetum repentis</i> Winterhoff 1963	Ourllets et Prairies	8	125 m²	NT	NI	NI
				Hab. 4	Communauté basale à <i>Juncus bufonius</i>	Végétations amphibies et de bas-marais	2	31 m²	NT	2	2190-2
1312	Tvx	3	2 845 m²	U	<i>Ophioglosso vulgati</i> - <i>Calamagrostietum epigeji</i> V. Westh. & Segal 1961	Végétations amphibies et de bas-marais	100	2 845 m²	T	1	2190-3
1313	Tvx	3	1 340 m²	Hab. 1	<i>Solano dulcamarae</i> - <i>Phragmitetum australis</i> (Krausch 1965) Succow 1974	Roselières	85	1 139 m²	NT	2	2190-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Salicion cinereae</i> T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	10	134 m²	NE	NE	2180-1
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Convolvulion sepium</i> Tüxen in Oberd. 1957	Mégaphorbiaies	5	67 m²	NT	2	6430-4
1314	Tvx	3	2 224 m²	Hab. 1	Groupement dunaire à <i>Eupatorium cannabinum</i> et <i>Calamagrostis epigejos</i> Duhamel 2009	Mégaphorbiaies	50	1 112 m²	NT	2	2190-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Salicion cinereae</i> T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	40	890 m²	NT	NE	2180-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	10	222 m²	NT	2	2190-3
1315		3	3 756 m²	U	<i>Non prospecté</i>	Milieux anthropisés	100	3 756 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1316		3	1 320 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 320 m²	NT	3	2120-1
1317		3	9 880 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	9 880 m²	T	2	2120-1
1318		3	3 523 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	3 523 m²	T	2	2120-1
1319		3	5 145 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	4 374 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	772 m²	NT	3	2130-1*
1320		3	270 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	270 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1321		3	387 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	329 m²	T	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	15	58 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1322	P70	3	975 m²	Hab. 1	Communauté basale à Juncus articulatus	Roselières	7	68 m²	NT	NE	2190-3
				Hab. 2	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	3	29 m²	NT	3	2190-2
				Hab. 3	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	90	878 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1323		3	8 153 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	4 484 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	45	3 669 m²	NT	2	2130-1*
1324	Tvx	3	3 248 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	38	1 234 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Magnocaricion elatae W. Koch 1926	Roselières	30	975 m²	NE	1	2190-5
				Hab. 3	Cladietum marisci Allorge 1922	Roselières	15	487 m²	T	1	2190-5
				Hab. 4	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvern. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	15	487 m²	T	1	2190-3
				Hab. 5	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	2	65 m²	NT	2	2180-1
1325		3	96 223 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	96 223 m²	NE	NE	2180-1
1326		3	369 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	55	203 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis Tüxen 1947</i>	Prairies hygroclines à hygrophiles	45	166 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1327		3	2 950 m²	U	<i>Culture à gibier</i>	Milieux anthropisés	100	2 950 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1328		3	24 608 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	24 608 m²	T	1	2180-5
1329		3	10 724 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	85	9 115 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Carici arenariae - Festucion filiformis de Foucault 1994	Pelouses dunaires	15	1 609 m²	NE	NE	6230-9*
1330		3	4 232 m²	U	<i>Non prospecté</i>	Milieux anthropisés	100	4 232 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1331		3	5 073 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	5 073 m²	T	1	2180-5
1332		3	2 371 m²	U	<i>Non prospecté</i>	Milieux anthropisés	100	2 371 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1333	Tvx	3	3 955 m²	Hab. 1	Groupement dunaire à Lonicera periclymenum et Teucrium scorodonia Duhamel 1994 nom. ined.	Ourllets et Prairies	99	3 916 m²	NE	2	2130-4*
				Hab. 2	Communauté à Danthonia decumbens et Carex arenaria	Ourllets et Prairies	1	40 m²	NT	1	6230-9*
1334	Tvx	3	2 402 m²	U	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvern. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	100	2 402 m²	NT	2	2190-3
1335		3	715 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	715 m²	NT	3	2130-1*
1336		3	3 193 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	3 193 m²	T	1	2160-1
1337		3	916 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	916 m²	T	1	2180-5
1338		3	4 019 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	4 019 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1339		3	2 102 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	85	1 787 m²	T	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	15	315 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1340		3	227 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	227 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1341		3	35 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	35 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1342		3	6 915 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	70	4 840 m²	T	3	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	1 383 m²	NT	2	2130-1*
				Hab. 3	Euphorbio paraliae - Festucetum arenariae Géhu 1963 nom. corr.	Dune bordière	5	346 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 4	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	5	346 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1343		3	658 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	658 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1344		3	21 444 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Charetalia hispidae F. Sauer ex Krausch 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	50	10 722 m²	NE	NE	2190-1
				Hab. 2	<i>Plan d'eau non végétalisé</i>	Végétations aquatiques - Plans d'eau	50	10 722 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1345		3	204 m²	U	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	100	204 m²	T	1	2190-2
1346		3	1 781 m²	U	<i>Non prospecté</i>	Milieux anthropisés	100	1 781 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1347		3	2 695 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictrum flavum - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	85	2 291 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Phragmites communis W. Koch 1926	Roselières	15	404 m²	NE	NE	2190-5
1348		3	5 784 m²	U	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	100	5 784 m²	NE	NE	6510-4
1349		3	314 m²	U	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	100	314 m²	NE	NE	6510-4
1350		3	7 615 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	7 615 m²	T	1	2180-5
1351		3	779 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	75	585 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	25	195 m²	NE	NE	2130-4*
1352		3	4 565 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	75	3 424 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	25	1 141 m²	NE	NE	2130-4*

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
1353		3	26 071 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	26 071 m²	NE	NE	2180-1
1354		3	1 643 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 643 m²	T	1	2180-5
1355	Tvx	3	5 647 m²	U	Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	100	5 647 m²	T	1	2190-3
1356		3	733 m²	U	<i>Non prospecté</i>	Milieux anthropisés	100	733 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1357		3	1 861 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 861 m²	NT	3	2120-1
1358		3	496 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	496 m²	NT	2	2160-1
1359		3	22 179 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	22 179 m²	T	2	2120-1
1360	P71	3	565 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, de Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov</i>	Fourrés dunaires	97	548 m²	T	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	3	17 m²	NT	3	2190-2
1361		3	183 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	183 m²	NT	3	2130-1*
1362		3	58 042 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	58 042 m²	NT	2	2160-1
1363		3	5 493 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Phragmition communis W. Koch 1926	Roselières	75	4 119 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 2	Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis Schaminée & V. Westh. in Schaminée et al. 1992	Végétations amphibies et de bas-marais	25	1 373 m²	NE	NE	2190-2
1364		3	1 042 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	75	781 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	25	260 m²	NE	NE	2130-4*
1365		3	1 537 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	75	1 153 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	25	384 m²	NE	NE	2130-4*
1366		3	4 777 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	4 777 m²	T	1	2180-5
1367		3	1 663 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	55	915 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis Tüxen 1947</i>	Prairies hygroclines à hygrophiles	45	748 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1368		3	383 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Charetalia hispidae F. Sauer ex Krausch 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	65	249 m²	NE	NE	2190-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ranunculion aquatilis H. Passarge 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	35	134 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1369		3	97 m²	U	<i>Zone anthropisée</i>	Milieux anthropisés	100	97 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1370	Tvx	3	3 712 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Magnocaricion elatae W. Koch 1926	Roselières	95	3 526 m²	NT	2	2190-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	5	186 m²	NT	2	2190-3
1371		3	451 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	70	316 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	20	90 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Phragmition communis W. Koch 1926	Roselières	10	45 m²	NE	NE	2190-5
1372		3	2 066 m²	U	<i>Zone anthropisée</i>	Milieux anthropisés	100	2 066 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1373		3	592 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	592 m²	T	1	2160-1
1374		3	23 132 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	23 132 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1375	P72	3	2 499 m²	Hab. 1	Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	34	850 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 2	Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	33	825 m²	T	3	2190-3
				Hab. 3	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	33	825 m²	T	3	2160-1
1376		3	11 603 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	11 603 m²	T	2	2120-1
1377		3	17 142 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	60	10 285 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	20	3 428 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 3	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	3 428 m²	NT	3	2130-1*
1378		3	195 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	195 m²	NT	3	2130-1*
1379		3	1 779 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	55	978 m²	NE	NE	2180-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	45	800 m²	NE	NE	2190-3
1380		3	1 172 m²	Hab. 1	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	65	762 m²	T	1	2190-2
				Hab. 2	Cladietum marisci Allorge 1922	Roselières	35	410 m²	NE	2	2190-5
1381		3	267 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	85	227 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Phragmition communis W. Koch 1926	Roselières	15	40 m²	NE	NE	2190-5
1382	Tvx	3	1 386 m²	U	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	1 386 m²	NT	2	2190-3
1383	Tvx	3	3 653 m²	Hab. 1	Colchico autumnnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	80	2 922 m²	NT	2	6510-4
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Charetalia hispidae F. Sauer ex Krausch 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	13	475 m²	NE	NE	2190-1
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	5	183 m²	NT	NE	2190-3
				Hab. 4	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Phragmition communis W. Koch 1926	Roselières	2	73 m²	NE	NE	2190-5
1384		3	687 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	55	378 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	45	309 m²	NE	2	2130-1*
1385		3	229 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	229 m²	NT	3	2130-1*
1386		3	2 391 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	1 794 m²	NT	3	2120-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Agropyretum junceiformis R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952 corr. Darimont, Duv. & Lamb. 1962	Dune bordière	25	598 m²	NE	3	2110-1
1387		3	423 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	423 m²	NT	2	2130-1*
1388		3	213 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	213 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1389		3	863 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	647 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	20	173 m²	NT	3	2130-1*

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
				Hab. 3	<i>Claytonio perfoliatae</i> - <i>Anthriscetum caucalidis</i> Izco, Géhu et Delelis 1978	Ourlets et Prairies	5	43 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1390		3	401 m²	U	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	100	401 m²	T	1	2190-2
1391		3	226 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	55	124 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Potentillo anserinae</i> - <i>Polygonetalia avicularis</i> Tüxen 1947	Prairies hygroclines à hygrophiles	45	102 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1392		3	24 623 m²	U	<i>Culture à gibier</i>	Milieux anthropisés	100	24 623 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1393		3	2 505 m²	U	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	100	2 505 m²	NE	NE	6510-4
1394		3	334 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	75	250 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Carici arenariae - Festucion filiformis de Foucault 1994	Pelouses dunaires	25	83 m²	NE	NE	6230-9*
1395		3	2 085 m²	U	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	100	2 085 m²	NE	NE	6510-4
1396		3	1 475 m²	Hab. 1	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	60	885 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	40	590 m²	NE	3	2120-1
1397		3	800 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	70	560 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	10	80 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 3	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	20	160 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 060 m²	NT	3	2120-1
1399		3	954 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Ammophilenion arenariae Géhu 1988	Dune bordière	65	620 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	35	334 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1400		3	606 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	454 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	151 m²	NT	3	2120-1
1401		3	1 424 m²	Hab. 1	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	75	1 068 m²	NT	3	2130-1*
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	356 m²	NT	3	2120-1
1402		3	2 483 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	2 483 m²	T	2	2130-1*
1403		3	5 139 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	5 139 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1404		3	20 612 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	15 459 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	5 153 m²	NT	2	2130-1*
1405		3	1 143 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	171 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 2	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	85	971 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1406		3	61 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	61 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1407		3	216 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	216 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1408		3	1 411 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 411 m²	T	1	2180-5
1409		3	1 867 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	55	1 027 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Potentillo anserinae</i> - <i>Polygonetalia avicularis</i> Tüxen 1947	Prairies hygroclines à hygrophiles	45	840 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1410		3	294 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	55	162 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Potentillo anserinae</i> - <i>Polygonetalia avicularis</i> Tüxen 1947	Prairies hygroclines à hygrophiles	45	132 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1411		3	336 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	55	185 m²	NE	NE	2190-3
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Potentillo anserinae</i> - <i>Polygonetalia avicularis</i> Tüxen 1947	Prairies hygroclines à hygrophiles	45	151 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1412		3	12 438 m²	U	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	100	12 438 m²	NE	NE	6510-4
1413		3	192 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ranunculion aquatilis H. Passarge 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	60	115 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Potentillo anserinae</i> - <i>Polygonetalia avicularis</i> Tüxen 1947	Prairies hygroclines à hygrophiles	20	38 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Charetalia hispidae F. Sauer ex Krausch 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	20	38 m²	NE	NE	2190-1
1414		3	2 407 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	2 407 m²	NT	3	2120-1
1415		3	515 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	515 m²	NT	2	2160-1
1416		3	312 m²	Hab. 1	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	55	171 m²	NE	3	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	45	140 m²	NE	3	2120-1
1417		3	11 767 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	10 002 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	1 765 m²	NT	2	2130-1*
1418		3	175 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	131 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	44 m²	NT	3	2120-1
1419		3	2 458 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	2 090 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	369 m²	NT	2	2130-1*
1420		3	3 971 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	2 979 m²	NT	2	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	993 m²	NT	2	2130-1*
1421		3	217 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	163 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	54 m²	NT	3	2120-1
1422		3	1 106 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	100	1 106 m²	NE	NE	2190-5
1423		3	1 041 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	1 041 m²	NE	NE	2130-4*
1424		3	626 m²	Hab. 1	Groupe ment à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	55	344 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	45	282 m²	NE	NE	2130-4*
1425		3	4 326 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	65	2 812 m²	NE	NE	2130-4*

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	35	1 514 m²	NE	NE	2180-1
1426		3	1 186 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	1 186 m²	NE	NE	2130-4*
1427		3	3 108 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	55	1 709 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	45	1 399 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1428		3	4 330 m²	U	Groupeement dunaire à Carex arenaria et Betula pendula Duhamel 2009	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	4 330 m²	NE	1	2180-1
1429		3	4 311 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Carici arenariae - Festucion filiformis de Foucault 1994	Pelouses dunaires	40	1 724 m²	NE	NE	6230-9*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	40	1 724 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 3	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	20	862 m²	NE	NE	6510-4
1430		3	615 m²	U	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	100	615 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1431		3	1 578 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Carici arenariae - Festucion filiformis de Foucault 1994	Pelouses dunaires	55	868 m²	NE	NE	6230-9*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	45	710 m²	NE	NE	2130-4*
1432		3	1 385 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 385 m²	NT	3	2120-1
1433		3	4 315 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	4 315 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1434		3	29 156 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	16 036 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	15	4 373 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 3	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	30	8 747 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1435		3	390 m²	Hab. 1	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	55	214 m²	NE	3	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	45	175 m²	NE	3	2120-1
1436		3	390 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	55	214 m²	NE	3	2120-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis Géhu & Géhu-Franck 1983	Fourrés dunaires	15	58 m²	NE	NE	2160-1
				Hab. 3	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	30	117 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1437		3	2 515 m²	U	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	100	2 515 m²	NE	2	2160-1
1438		3	419 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	419 m²	NT	3	2120-1
1439		3	1 448 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	1 231 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	217 m²	NT	2	2130-1*
1440		3	244 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	244 m²	NT	3	2120-1
1441		3	578 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	433 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	144 m²	NT	2	2130-1*
1442		3	7 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	7 m²	NT	3	2120-1
1443		3	511 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	511 m²	NT	3	2120-1
1444	P74	3	726 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	726 m²	T	2	2160-1
1445		3	2 324 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	2 324 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1446		3	4 680 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	3 510 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	1 170 m²	NT	3	2120-1
1447		3	690 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	690 m²	NE	NE	2130-4*
1448		3	684 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	684 m²	NE	NE	2130-4*
1449		3	2 577 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	2 577 m²	NE	NE	2130-4*
1450		3	480 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Carici arenariae - Festucion filiformis de Foucault 1994	Pelouses dunaires	55	264 m²	NE	NE	6230-9*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	45	216 m²	NE	NE	2130-4*
1451		3	6 601 m²	Hab. 1	Groupeement dunaire à Carex arenaria et Betula pendula Duhamel 2009	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	85	5 611 m²	NE	2	2180-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictrio flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	15	990 m²	NE	NE	2190-5
1452		3	1 166 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 166 m²	NT	3	2120-1
1453		3	2 249 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	2 249 m²	T	2	2120-1
1454		3	1 911 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	1 624 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	287 m²	NT	3	2120-1
1455	Tvx	3	1 366 m²	U	Groupeement à Salix cinerea des dépressions dunaires Géhu 1982	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 366 m²	T	1	2180-1
1456	Tvx	3	1 123 m²	U	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	1 123 m²	NT	1	2190-3
1457		3	383 m²	Hab. 1	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	55	211 m²	NT	2	2190-3
				Hab. 2	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	45	172 m²	NT	2	2160-1
1458	Tvx	3	945 m²	U	Pyrolo rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. & J. Géhu 1983 nom. inval. (art. 3o, 5)	Fourrés dunaires	100	945 m²	T	1	2160-1
1459	P75	3	222 m²	Hab. 1	Communauté basale à Juncus articulatus	Roselières	48	106 m²	NT	NE	2190-3
				Hab. 2	Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	Végétations amphibies et de bas-marais	48	106 m²	NT	3	2190-2
				Hab. 3	Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	3	7 m²	NT	3	2190-2
				Hab. 4	Carici pulchellae - Agrostietum 'maritimae' (Wattez 1975) de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	1	2 m²	NT	3	2190-3
1460		3	2 946 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	2 210 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	737 m²	NT	2	2130-1*
1461		3	551 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	551 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1462		3	419 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	419 m²	NT	3	2120-1
1463		3	277 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	208 m²	NT	2	2120-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	69 m²	NT	2	2130-1*
1464		3	1 388 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 388 m²	NT	3	2120-1
1465		3	354 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	265 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	88 m²	NT	3	2120-1
1466		3	784 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	784 m²	NE	NE	2130-4*
1467		3	3 624 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	3 624 m²	NE	NE	2130-4*
1468		3	4 124 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thalictrio flavi - Filipendulion ulmariae de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	100	4 124 m²	NE	NE	2190-5
1469		3	446 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	446 m²	NE	NE	2130-4*
1470		3	593 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	593 m²	NE	NE	2130-4*
1471		3	6 768 m²	Hab. 1	Groupeement dunaire à Carex arenaria et Betula pendula Duhamel 2009	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	55	3 722 m²	NE	1	2180-1
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Carici arenariae - Festucion filiformis de Foucault 1994	Pelouses dunaires	45	3 046 m²	NE	NE	6230-9*
1472		3	26 138 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Carici arenariae - Festucion filiformis de Foucault 1994	Pelouses dunaires	40	10 455 m²	NE	NE	6230-9*
				Hab. 2	Colchico autumnnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	40	10 455 m²	NE	NE	6510-4
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	20	5 228 m²	NE	NE	2130-4*
1473		3	1 131 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	1 131 m²	NT	3	2120-1
1474		3	1 850 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	70	1 295 m²	NE	2	2120-1
				Hab. 2	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	10	185 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 3	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	20	370 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1475		3	2 348 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	2 348 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1476		3	459 m²	U	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	100	459 m²	NT	2	2160-1
1477		3	13 316 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	13 316 m²	T	2	2120-1
1478		3	4 342 m²	Hab. 1	Sambuco nigrae - Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) Boerboom 1960	Fourrés dunaires	55	2 388 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	45	1 954 m²	NE	2	2120-1
1479		3	2 367 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	2 367 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1480		3	4 381 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	4 381 m²	NT	3	2120-1
1481		3	487 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	365 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	122 m²	NT	2	2130-1*
1482		3	2 093 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	75	1 570 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	25	523 m²	NT	3	2120-1
1483		3	3 041 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	2 281 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	760 m²	NT	2	2130-1*
1484		3	1 068 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	1 068 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1485		3	459 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	459 m²	NE	NE	2130-4*
1486		3	1 176 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	40	470 m²	NE	NE	2180-1
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	470 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 3	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	20	235 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1487		3	128 m²	Hab. 1	Groupeement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	60	77 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	20	26 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 3	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulo arvensis - Agropyron repens Görs 1966</i>	Friches et végétations rudérales	20	26 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1488		3	1 189 919 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 189 919 m²	T	1	2180-5
1489		3	1 705 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	1 705 m²	NE	NE	2130-4*
1490		3	3 382 m²	Hab. 1	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	85	2 875 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	507 m²	NE	3	2120-1
1491		3	1 890 m²	Hab. 1	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	85	1 606 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	283 m²	NE	3	2120-1
1492		3	895 m²	U	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	100	895 m²	NT	2	2120-1
1493		3	3 116 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	2 649 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	467 m²	NT	3	2120-1
1494		3	353 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	353 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1495		3	7 561 m²	Hab. 1	Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	75	5 670 m²	NT	2	2120-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	25	1 890 m²	NT	2	2130-1*
1496		3	51 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	51 m²	T	2	2130-1*
1497		3	290 m²	U	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	100	290 m²	T	2	2130-1*
1498		3	3 931 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	3 931 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1499		3	1 636 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	85	1 391 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Groupeement à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	15	245 m²	NE	NE	2130-1*
1500		3	556 m²	Hab. 1	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	55	306 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	45	250 m²	NE	<i>NI</i>	<i>NI</i>
1501		3	2 221 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	2 221 m²	NE	NE	2130-4*

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
1502		3	3 154 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Thalictro flavi</i> - <i>Filipendulion ulmariae</i> de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	100	3 154 m²	NE	NE	2190-5
1503		3	47 m²	Hab. 1	<i>Ligustro vulgaris</i> - <i>Hippophaetum rhamnoidis</i> Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	40 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	<i>Euphorbio paraliae</i> - <i>Ammophiletum arenariae</i> R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	7 m²	NT	3	2120-1
1504		3	3 794 m²	Hab. 1	<i>Ligustro vulgaris</i> - <i>Hippophaetum rhamnoidis</i> Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	3 225 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	<i>Euphorbio paraliae</i> - <i>Ammophiletum arenariae</i> R. Tüxen 1945 in Braun-Blanq. & R. Tüxen 1952	Dune bordière	15	569 m²	NT	3	2120-1
1505		3	94 m²	U	<i>Sables dunaires secs non végétalisés</i>	Dune bordière	100	94 m²	NE	NI	NI
1506		3	11 904 m²	Hab. 1	<i>Ligustro vulgaris</i> - <i>Hippophaetum rhamnoidis</i> Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	10 119 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	1 786 m²	NT	2	2130-1*
1507		3	5 832 m²	Hab. 1	Groupe ment à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	60	3 499 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	20	1 166 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 3	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulo arvensis - Agropyron repentis Görs 1966</i>	Friches et végétations rudérales	20	1 166 m²	NE	NI	NI
1508		3	1 297 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	100	1 297 m²	NE	NE	2130-4*
1509		3	902 m²	U	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	100	902 m²	NE	NI	NI
1510		3	15 255 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) de l'Alnion glutinosae Malcuit 1929	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	15 255 m²	NE	NE	2180-1
1511		3	2 464 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	100	2 464 m²	NE	NE	2130-4*
1512		3	1 779 m²	Hab. 1	Groupe ment à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	60	1 068 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	20	356 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 3	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulo arvensis - Agropyron repentis Görs 1966</i>	Friches et végétations rudérales	20	356 m²	NE	NI	NI
1513		3	607 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	100	607 m²	NE	NE	2130-1*
1514		3	2 194 m²	U	<i>Plan d'eau non végétalisé</i>	Végétations aquatiques - Plans d'eau	100	2 194 m²	NE	NI	NI
1515		3	7 188 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Loto tenuis - Trifolion fragiferi V. Westh., C. Leeuwen & Adriani ex de Foucault 2008</i>	Prairies hygroc lines à hygrophiles	70	5 032 m²	NE	NI	NI
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Thalictro flavi</i> - <i>Filipendulion ulmariae</i> de Foucault in J.-M. Royer et al. 2006	Mégaphorbiaies	20	1 438 m²	NE	NE	2190-5
				Hab. 3	<i>Samolo valerandi</i> - <i>Baldellion ranunculoidis</i> Schaminée & V. Westh. in Schaminée et al. 1992	Végétations amphibies et de bas-marais	10	719 m²	NE	NE	2190-2
1516		3	5 580 m²	Hab. 1	Groupe ment à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	60	3 348 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	20	1 116 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 3	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulo arvensis - Agropyron repentis Görs 1966</i>	Friches et végétations rudérales	20	1 116 m²	NE	NI	NI
1517		3	310 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	50	155 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	<i>Ligustro vulgaris</i> - <i>Hippophaetum rhamnoidis</i> Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	77 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 3	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	25	77 m²	NE	NI	NI
1518		3	3 014 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	50	1 507 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	<i>Ligustro vulgaris</i> - <i>Hippophaetum rhamnoidis</i> Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	753 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 3	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	25	753 m²	NE	NI	NI
1519		3	974 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	50	487 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	<i>Ligustro vulgaris</i> - <i>Hippophaetum rhamnoidis</i> Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	244 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 3	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	25	244 m²	NE	NI	NI
1520		3	2 294 m²	Hab. 1	<i>Ligustro vulgaris</i> - <i>Hippophaetum rhamnoidis</i> Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	85	1 950 m²	T	1	2160-1
				Hab. 2	Tortulo ruraliformis - Phleetum arenarii (Massart 1908) Braun-Blanq. & De Leeuw 1936	Pelouses dunaires	15	344 m²	NT	2	2130-1*
1521		3	25 344 m²	Hab. 1	<i>Ligustro vulgaris</i> - <i>Hippophaetum rhamnoidis</i> Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	40	10 138 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 2	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	40	10 138 m²	NE	NI	NI
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	20	5 069 m²	NE	NE	2130-4*
1522		3	5 309 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Caricenion pulchello-trinervis</i> Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	5 309 m²	NE	NE	2190-3
1523		3	1 450 m²	U	<i>Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris</i> de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	100	1 450 m²	NE	NE	6510-4
1524	Tvx	3	4 857 m²	Hab. 1	<i>Samolo valerandi</i> - <i>Littorelletum uniflorae</i> V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943	Végétations amphibies et de bas-marais	40	1 943 m²	T	1	2190-2
				Hab. 2	<i>Drepanoclado adunci</i> - <i>Caricetum trinervis</i> J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	40	1 943 m²	T	1	2190-3
				Hab. 3	<i>Samolo valerandi</i> - <i>Eleocharitetum quinqueflorae</i> Julve 1992 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	20	971 m²	NT	1	2190-3
1525		3	8 203 m²	U	<i>Culture à gibier</i>	Milieux anthropisés	100	8 203 m²	NE	NI	NI
1526		3	316 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	50	158 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	<i>Ligustro vulgaris</i> - <i>Hippophaetum rhamnoidis</i> Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	79 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 3	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	25	79 m²	NE	NI	NI
1527		3	581 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourllets et Prairies	50	290 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	<i>Ligustro vulgaris</i> - <i>Hippophaetum rhamnoidis</i> Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	25	145 m²	NE	2	2160-1
				Hab. 3	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952</i>	Fourrés dunaires	25	145 m²	NE	NI	NI
1528	Tvx	3	6 314 m²	Hab. 1	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Convolvulo arvensis - Agropyron repentis Görs 1966</i>	Friches et végétations rudérales	70	4 420 m²	NE	NI	NI
				Hab. 2	<i>Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris</i> de Foucault 1989	Ourllets et Prairies	20	1 263 m²	NT	2	6510-4
				Hab. 3	<i>Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis Tüxen 1947</i>	Prairies hygroc lines à hygrophiles	10	631 m²	NT	NI	NI
1529	Tvx	3	731 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Phragmition communis</i> W. Koch 1926	Roselières	90	658 m²	NT	2	2190-5
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du <i>Magnocaricion elatae</i> W. Koch 1926	Roselières	10	73 m²	NT	2	2190-5
1530	Tvx	3	2 676 m²	Hab. 1	<i>Plan d'eau non végétalisé</i>	Végétations aquatiques - Plans d'eau	80	2 141 m²	NE	NI	NI
				Hab. 2	Groupe ment à <i>Potamogeton gramineus</i> et characées Duhamel 1995 nom. ined.	Végétations aquatiques - Plans d'eau	20	535 m²	NE	NE	2190-1

Num. Poly.	Obs. Poly.	Num. Ent.	Surface Polygone	Num. Hab.	Végétation	Grand Type de Milieu	Rec. (%)	Surface Habitat	Typi cité	Etat Cons.	Code C.Hab.
1531		3	4 664 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	4 664 m²	NE	NE	2180-1
1532		3	2 255 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	55	1 241 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952	Fourrés dunaires	45	1 015 m²	NE	NI	NI
1533		3	138 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952	Fourrés dunaires	100	138 m²	NE	NI	NI
1534		3	1 105 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952	Fourrés dunaires	100	1 105 m²	NE	NI	NI
1535		3	2 295 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Carici arenariae - Festucion filiformis de Foucault 1994	Pelouses dunaires	40	918 m²	NE	NE	6230-9*
				Hab. 2	Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989	Ourlets et Prairies	40	918 m²	NE	NE	6510-4
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	20	459 m²	NE	NE	2130-4*
1536		3	7 983 m²	U	Ligustro vulgaris - Betuletum pubescentis Géhu & Wattez 1978	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	7 983 m²	NT	2	2180-5
1537		3	31 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Charetalia hispidae F. Sauer ex Krausch 1964	Végétations aquatiques - Plans d'eau	75	23 m²	NE	NE	2190-1
				Hab. 2	Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis Schaminée & V. Westh. in Schaminée et al. 1992	Végétations amphibies et de bas-marais	25	8 m²	NE	NE	2190-2
1538		3	651 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Caricenion pulchello-trinervis Julve ex de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	651 m²	NE	NE	2190-3
1539		3	883 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	75	662 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Carici arenariae - Festucion filiformis de Foucault 1994	Pelouses dunaires	25	221 m²	NE	NE	6230-9*
1540		3	193 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952	Fourrés dunaires	100	193 m²	NE	NI	NI
1541		3	603 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	603 m²	NE	NE	2130-4*
1542		3	1 403 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	60	842 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Groupe ment à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	20	281 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952	Fourrés dunaires	20	281 m²	NE	NI	NI
1543		3	506 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952	Fourrés dunaires	55	278 m²	NE	NI	NI
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	228 m²	NE	2	2160-1
1544		3	2 284 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952	Fourrés dunaires	55	1 256 m²	NE	NI	NI
				Hab. 2	Ligustro vulgaris - Hippophaetum rhamnoidis Meltzer 1941 em. Boerboom 1960 nom. invers.	Fourrés dunaires	45	1 028 m²	NE	2	2160-1
1545		3	8 830 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	60	5 298 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Groupe ment à Galium verum var. maritimum et Luzula campestris Duhamel 1995 nom. ined.	Pelouses dunaires	20	1 766 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 3	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952	Fourrés dunaires	20	1 766 m²	NE	NI	NI
1546		3	17 410 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	17 410 m²	NE	NE	2180-1
1547		3	436 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	55	240 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thero-Airion Tüxen ex Oberd. 1957	Pelouses dunaires	45	196 m²	NE	NE	2130-5*
1548		3	259 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Koelerion albescentis Tüxen 1937	Pelouses dunaires	55	142 m²	NE	NE	2130-1*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Thero-Airion Tüxen ex Oberd. 1957	Pelouses dunaires	45	116 m²	NE	NE	2130-5*
1549		3	1 980 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	1 980 m²	NE	NE	2180-1
1550		3	3 071 m²		Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	100	3 071 m²	NE	2	2190-3
1551	Txv	3	6 157 m²	Hab. 1	Carici trinervis - Schoenetum nigricantis de Foucault 2008	Végétations amphibies et de bas-marais	70	4 310 m²	T	1	2190-3
				Hab. 2	Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis J. Duvign. 1947 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	29	1 786 m²	T	1	2190-3
				Hab. 3	Samolo valerandi - Eleocharitetum quinqueflorae Julve 1992 prov.	Végétations amphibies et de bas-marais	1	62 m²	NT	2	2190-3
1552		3	4 606 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	75	3 454 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Carici arenariae - Festucion filiformis de Foucault 1994	Pelouses dunaires	25	1 151 m²	NE	NE	6230-9*
1553		3	1 657 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	55	912 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952	Fourrés dunaires	45	746 m²	NE	NI	NI
1554		3	3 408 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Salicion cinereae T. Müll. et Görs 1958	Fourrés et Forêts de l'hygrosère	100	3 408 m²	NE	NE	2180-1
1555	Tvx	3	1 441 m²	U	Calamagrostio epigeji - Juncetum subnodulosi J. Duvign. 1947	Végétations amphibies et de bas-marais	100	1 441 m²	NT	2	2190-3
1556		3	435 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	75	326 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Carici arenariae - Festucion filiformis de Foucault 1994	Pelouses dunaires	25	109 m²	NE	NE	6230-9*
1557		3	3 878 m²	Hab. 1	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	55	2 133 m²	NE	NE	2130-4*
				Hab. 2	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Prunetalia spinosae Tüxen 1952	Fourrés dunaires	45	1 745 m²	NE	NI	NI
1558		3	3 189 m²	U	Communauté(s) basale(s) ou non définie(s) du Galio littoralis - Geranion sanguinei Géhu & Géhu-Franck 1983	Ourlets et Prairies	100	3 189 m²	NE	NE	2130-4*